



การเลี้ยงสุกร



เอกสารก้าวหน้า

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ISBN 974-682-179-2

การเลี้ยงสุกร

ลิขสิทธิ์

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จัดพิมพ์โดย

สำนักพัฒนาการปศุสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0-2653-4493, 0-2653-4444 ต่อ 3356 โทรสาร 0-2653-4934

พิมพ์ที่

โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด

79 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2544 จำนวน 20,000 เล่ม

พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2545 จำนวน 20,000 เล่ม

พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2546 จำนวน 30,000 เล่ม (ปรับปรุง)

พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2548 จำนวน 17,000 เล่ม (ปรับปรุง)

ผู้เรียบเรียง

นายสัมฤทธิ์ แสนบัว

นางสาวจิรพรรณ นพวงศ์ ณ อยุธยา

นายวิศาล ศรีสุริยะ

นางสาววิจัย บรรลุทอง

นายกมล ฉวีวรรณ

นางสาวโรชา เจียมรัมย์

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา

โทร. 0-4431-5444, 0-4424-9296

กลุ่มวิจัยและพัฒนาสัตว์เล็ก กองบำรุงพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์

โทร. 0-2653-4453, 0-2653-4444 ต่อ 3241, 3242

คำนำ

เอกสารคำแนะนำการเลี้ยงสุกรเล่มนี้ ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการให้ความรู้พื้นฐานแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย เป็นการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสุกร ให้เกษตรกรมีความรู้ด้านการปฏิบัติเลี้ยงดูสุกรอย่างง่าย ๆ ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งจะเป็นการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลกำไรให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร

กรมปศุสัตว์

សារចំណាំ

អង្គភាព

ការលើយំសុករ	1
ផ័នីតិសុករ	2
ការប្រើប្រាស់បញ្ជី	7
ការប្រើប្រាស់បញ្ជី និងការគ្រប់ការសុករ	9
អាហារ និងការធ្វើអាហារសុករ	13
ទំនួរសុករ	22
ការសុខាភិបាល ការបៀវជនក្នុងសុករ និងការប្រើប្រាស់បញ្ជី	27
ការឱ្យយាប់បៀវជននិងការប្រើប្រាស់បញ្ជី	31
ការវិភាគនិងការប្រើប្រាស់បញ្ជី	33
ការគេលីនយោសុករ	34
តារាងការប្រើប្រាស់បញ្ជី	40
បញ្ជីសុករ	42
ពាណិជ្ជកម្មសុករ	42
ការប្រើប្រាស់បញ្ជី	43

การเลี้ยงสุกร

ปัจจุบันการเลี้ยงสุกรในประเทศไทยได้มีการพัฒนาการด้านพันธุ์อาหารสัตว์ การจัดการและการสุขาภิบาล จนทัดเทียมกับต่างประเทศ การเลี้ยงสุกรภายในประเทศ แม้จะมีฟาร์มใหญ่ ๆ แต่ก็ยังมีเกษตรกรรายย่อยที่ทำการเลี้ยงสุกรรายละ 1-20 ตัว ตามหมู่บ้านอยู่เป็นจำนวนมาก เกษตรกรรายย่อยดังกล่าวจำเป็นจะต้องได้รับความรู้ในด้านการเลี้ยงสุกรอย่างถูกต้อง เพื่อจะได้นำไปพัฒนาการเลี้ยงสุกรของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำรายได้ให้กับครอบครัว และยังจะได้ประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรให้ได้ผลดีด้วย

ปัจจัยที่จะทำให้การเลี้ยงสุกรประสบความสำเร็จประกอบด้วย

1. สุกรพันธุ์ดี
2. อาหารดี
3. โรงเรือนดี
4. การจัดการเลี้ยงดูดี
5. การป้องกันโรคดี



เหตุผลในการเลี้ยงสุกร

1. สุกรสามารถเลี้ยงได้ในจำนวนน้อยตัว เป็นฟาร์มเล็ก ๆ
2. ในการเลี้ยงสุกรต้องการพื้นที่เพียงเล็กน้อย
3. การเลี้ยงสุกรใช้แรงงานน้อย เลี้ยงง่าย
4. ใช้เศษอาหารและของเหลือต่าง ๆ เป็นอาหารสุกรได้
5. มูลสุกรใช้เป็นปุ๋ยอย่างดี และใช้กับบ่อเลี้ยงปลา เพื่อเพิ่มผลผลิตของการเลี้ยงปลา

6. สุกรให้ลูกดก ขยายพันธุ์ได้เร็ว
7. การเลี้ยงสุกรเป็นกิจการที่ให้ผลกำไรดี สามารถคืนทุนได้ภายในเวลา 6 เดือน

พันธุ์สุกร

แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ตามการใช้ประโยชน์ คือ

1. ประเภทมัน เป็นสุกรูปร่างตัวสั้น อ้วนกลม มีมันมาก สะโพกเล็ก โตชา เช่น สุกรพันธุ์พื้นเมืองของประเทศไทย
2. ประเภทเนื้อ รูปร่างจะสั้นกว่าพันธุ์เบคอน ไหล่และสะโพกใหญ่ เด่นชัด ลำตัวหนาและเล็ก ได้แก่ พันธุ์ดูร์ครอเจอร์ซ์ เบอร์กเชียร์ แอมเซียร์ เป็นต้น
3. ประเภทเบคอน รูปร่างใหญ่ ลำตัวยาว มีเนื้อมาก ไขมันน้อย ความหนาและความลึกของลำตัวน้อยกว่าประเภทเนื้อ ได้แก่ พันธุ์แลนด์เรช ลาร์จไวท์ เป็นต้น

พันธุ์สุกรจากต่างประเทศ และพันธุ์สุกรพื้นเมืองที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทย ตามรายละเอียดดังนี้



1. **พันธุ์ลาร์จไวท์** มีลินกานิดในประเทศไทย อังกฤษนำเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2482 มีสีขาว หูตั้ง ลำตัวยาว กระดูกใหญ่ โครงใหญ่ หน้าสั้น หัวใหญ่ โตเต็มที่น้ำหนัก 200-250 กิโลกรัม ให้ลูกดกเฉลี่ย 9-10 ตัว เลี้ยงลูกเก่ง หย่านมเฉลี่ย 8-9 ตัว มีความแข็งแรง เจริญเติบโตเร็ว คุณภาพชาวดี พันธุ์ลาร์จไวท์ เหมาะที่ใช้เป็นทั้งสายพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์



2. พันธุ์แลนด์เรช มีถิ่นกำเนิดจากประเทศเดนมาร์ค นำเข้ามาในประเทศไทยปี พ.ศ. 2506 มีสีขาว หูปก หน้ายาว ลำตัวยาว มีช่องโถงมากถึง 16-17 คู่ (สุกรปกติมีกระดูกช่อง 15-16 คู่) โตเต็มที่ 200-250 กิโลกรัม

ให้ลูกดกเฉลี่ย 9-10 ตัว เลี้ยงลูกเก่ง หย่านมเฉลี่ย 8-9 ตัว มีข้อเสียคือ อ่อนแอ มักจะมีปัญหารံงขาอ่อน ขาไม่ค่อยแข็งแรง แก้ไขโดยต้องเลี้ยงด้วยอาหารที่มีคุณภาพดี พันธุ์แลนด์เรชเหมาะสมที่ใช้เป็นสายแม่พันธุ์



3. พันธุ์ดูร็อกเจอร์ช มีถิ่นกำเนิดจากประเทศอเมริกา มีสีแดง หูปกเป็นส่วนใหญ่ ลำตัวสั้นกว่าลาร์จไวท์ และแลนด์เรช ลำตัวหนา หลังโค้ง โตเต็มที่ 200-250 กิโลกรัม เป็นสุกรที่ให้ลูกไม่ดกเฉลี่ย 8-9 ตัว เลี้ยงลูกไม่เก่ง

หย่านมเฉลี่ย 6-7 ตัว ลูกสุกรหลังจากอายุ 2 เดือนไปแล้ว เจริญเติบโตเร็ว มีความแข็งแรงทนทานต่อสภาพพื้นที่อาณาเขตทุกชนิด นิยมใช้เป็นสายพ่อพันธุ์ เพื่อผลิตลูกผสมจะได้ลูกผสมที่สวยงาม แผ่นหลังกว้าง เจริญเติบโตเร็ว



4. พันธุ์เปียแตรง มีถิ่นกำเนิดจากประเทศเบลเยียม มีสีดำขาวเหลือง ลายสลับ เป็นสุกรที่มีรูปร่างสวยงาม กล้ามเนื้อเป็นมัดๆ แผ่นหลังกว้าง เป็นปีก สะโพกเห็นเด่นชัด โตเต็มที่ 150-200 กิโลกรัม มีเปอร์เซ็นต์

เนื้อแดงสูงมาก มีข้อเสียคือ ดื้นตกใจซึ่งติดตายง่าย และโตช้า ปัจจุบันนิยมใช้ผสมข้ามพันธุ์เป็นพ่อพันธุ์ในการผลิตสุกร軒

5. สุกรพื้นเมือง เป็นสุกรที่เลี้ยงอยู่ตามหมู่บ้านชนบทพวกร้าวๆ เล็กๆ โดยทั่วไป จะมีขนสีดำ ท้องยาน หลังแอ่น การเจริญเติบโตช้า ให้ลูกดก และเลี้ยงลูกเก่ง จะมีชื่อเรียกต่างกันไปตามท้องถิ่น เช่น สุกรพันธุ์ใหญ่ พันธุ์ควาย พันธุ์ราด พันธุ์พวง สุกรป่า เป็นต้น



5.1 สุกรพันธุ์ใหญ่ เลี้ยงตามภาคกลางและภาคใต้ของประเทศไทย มีสีดำปานขาว ตามลำตัวจะมีสีดำ ท้องมักมีสีขาว จมูกขาวและแอ่นเล็กน้อย คางย้อย ไหหล่อ หลังแอ่น สะโพกเล็ก มีอัตราการเจริญเติบโตและการสืบพันธุ์ได้ดีกว่าสุกรพื้นเมืองอื่นๆ แม่สุกรโตเต็มที่ หนักประมาณ 100-120 กิโลกรัม

5.2 สุกรพันธุ์ราดหรือพวง เลี้ยงตามภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือ และภาคใต้ มีขนสีดำคลอตตลอดตัว มีสีขาวปนแซมบ้างเล็กน้อย จมูกขาว ลำตัวสั้นป้อม หลังแอ่น ในทุตต์เล็ก ผิวนังหยาบ แม่สุกรโตเต็มที่หนักประมาณ 80-100 กิโลกรัม

5.3 สุกรพันธุ์ควาย เลี้ยงตามภาคเหนือและภาคกลาง มีลักษณะคล้ายสุกรใหญ่ แต่กต่างกันที่พันธุ์ควายจะมีสีดำ สุกรพันธุ์ควายมีหูใหญ่ ปรกเล็กน้อย มีรอยย่นตามลำตัว เป็นสุกรที่มีขนาดใหญ่กว่าสุกรพื้นเมืองพันธุ์อื่น แม่สุกรโตเต็มที่หนักประมาณ 100-125 กิโลกรัม

5.4 สุกรป่า เลี้ยงตามภาคต่างๆ ทั่วไป มีขนหยาบแจ้ง สีน้ำตาลเข้มหรือสีดำเข้ม หรือสีดอกเดา หนังหนา หน้ายาว จมูกขาวและแผลมกว่า สุกรพื้นเมือง ขาเล็กและเรียว คุปราดเปรี้ยว ที่พับมือยุ่ง 2 พันธุ์ คือพันธุ์หน้ายาว และพันธุ์หน้าสั้น แม่สุกรโตเต็มที่หนักประมาณ 80 กิโลกรัม

นอกจากนี้ก็มีสุกรพันธุ์แอนเชียร์ เบอร์กเชียร์ และเหวยชาน ที่นำเข้ามาทดลองเลี้ยงดูในประเทศไทย แต่ไม่นิยมเลี้ยงแพร่หลาย ที่นิยมเลี้ยงกันมากมีเพียง 3 พันธุ์เท่านั้น คือ ลาร์จไวท์ แลนด์เรช และดูร์อคเจอร์ชี

ส่วนสุกรลูกผสมที่ผลิตเป็นสุกรบุน นิยมใช้สุกรสามสายพันธุ์คือ ดูร์อคเจอร์ซี x แลนด์เรช-ลาร์จไวท์ (โดยใช้พ่อพันธุ์แท้ดูร์อคเจอร์ซี และแม่ลูกผสมแลนด์เรช-ลาร์จไวท์)



สุกรพันธุ์แยมเชียร์




สุกรพันธุ์เหมาย่าน

สุกรลูกผสมที่เหมาะสมในการใช้เลี้ยงสุกรบุน

การเลี้ยงสุกรพันธุ์แท้พันธุ์ใดพันธุ์หนึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ดังนั้น จึงนิยมนำพันธุ์แท้มาผสมสามพันธุ์ เพื่อทำให้ลูกที่เกิดขึ้นมีลักษณะของ เอตเตอร์โรซีส (Heterosis) หรือ ไฮบริดวิเกอร์ (Hybrid Vigor) หรือ เรียกว่าพลังอัดแจ กล่าวคือ ตัวลูกที่เกิดจากพ่อแม่ต่างพันธุ์กันนำมาผสมพันธุ์ จะให้ผลผลิต เช่น การเจริญเติบโต ความแข็งแรง ดีกว่าค่าเฉลี่ยของการให้ผลผลิต จากพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ที่ทำการนิยมทั่วไป สามารถนำมาใช้เป็นสุกรบุนได้ เช่น กัน แต่สากลนิยมทั่วไป มักใช้สุกรลูกผสมสามสายพันธุ์เป็นสุกรบุน คือ ดูร์อคเจอร์ซี x แลนด์เรช - ลาร์จไวท์ โดยใช้แม่สองสายพันธุ์คือ แลนด์เรช x ลาร์จไวท์ หรือ ลาร์จไวท์ x แลนด์เรช ซึ่งถือว่าเป็นสายแม่พันธุ์ที่มีคุณสมบัติการผลิตลูกดีที่สุด ส่วน พ่อสุกรทั้งจะใช้พ่อพันธุ์แท้เป็นพันธุ์ดูร์อคเจอร์ซี หรืออีกทางให้เลือกคือ ใช้พ่อพันธุ์แท้ เช่น ดูร์อคเจอร์ซี, ลาร์จไวท์, แลนด์เรช ผสมกับแม่พันธุ์แท้ เช่น พันธุ์แลนด์เรช, ลาร์จไวท์, ดูร์อคเจอร์ซี จะได้ลูกผสมสองสายพันธุ์ใช้เป็น สุกรบุนได้ตามแผนผังด้านล่าง

1. สุกรลูกผสมสามสายพันธุ์เพื่อใช้เป็นสุกรบุน



2. สุกรลูกผสมสองสายพันธุ์ เพื่อใช้เป็นสุกรบุน



การใช้สุกรบุนสองสายพันธุ์ ใช้ในกรณีที่เรามีแม่พันธุ์แท้อยู่แล้ว สุกร สองสายพันธุ์สามารถใช้เป็นสุกรบุนได้เป็นอย่างดี จะขึ้นอยู่กับคุณภาพสายพันธุ์ดูร็อกเจอร์ช แม่จะให้ลูกสองสายพันธุ์ที่แข็งแรงกว่า อายุไก่ตาม การผลิตสุกรบุนสองสายพันธุ์ จะทำให้ต้นทุนการผลิตสูงกว่าสุกรลูกผสม สามสายพันธุ์ เนื่องจากแม่สุกรพันธุ์แท้จัดหาซื้อมาในราคาก็แพงและแม่จะ อ่อนแอกว่าแม่สุกรลูกผสมสองสายพันธุ์

การปรับปรุงพันธุ์

หลักในการปรับปรุงพันธุ์สุกรนั้นมี 2 ข้อดังนี้

1. การคัดเลือกพันธุ์



สุกรที่จะใช้ทำพันธุ์นั้นจะคัดเลือกจากลักษณะภายนอกและจากพันธุ์ประวัติ การคัดเลือกจากลักษณะภายนอก เช่น รูป่างลักษณะ ถูกต้องตามสายพันธุ์ พิจารณาความแข็งแรงของขา ขาไม่แอบนเหมือนตื๊บเปิด ลำตัวยาว อวัยวะเพศปกติ เต้านมไม่ต่ำกว่า 12 เต้า หัวนมไม่น่บอุด ส่วนจากพันธุ์ประวัติได้จากการทดสอบพันธุ์ ดูอัตราการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการใช้อาหาร ความหนาไขมันสันหลัง และผลผลิตจากแม่พันธุ์ (ลูกดอก)

2. การผสมพันธุ์

เมื่อคัดเลือกพันธุ์ได้แล้วก็นำมาผสมพันธุ์เพื่อผลิตลูกต่อไปอย่างไรก็ตามจำเป็นจะต้องนำสุกรจากที่อื่นเข้ามารับปรุงด้วย เพื่อป้องกันเลือดซิด สุกรเพศผู้จะเริ่มใช้ผสมพันธุ์เมื่ออายุ 8 เดือนขึ้นไป ส่วนเพศเมียเริ่มใช้ผสมพันธุ์เมื่ออายุ 7-8 เดือน น้ำหนักประมาณ 100-120 กิโลกรัม สุกรแม่พันธุ์ควรจะให้ลูกครองแรกเมื่ออายุได้ 1 ปี แม่สุกรเป็นสัตดแต่ละรอบระยะเวลาห่างกัน 21 วัน ตั้งท้อง 114 วัน ควรทำการผสมแม่พันธุ์ 2 ครั้ง ห่างกัน 24 ชั่วโมง (เช้า-เช้า หรือ เย็น-เย็น) หรือมากกว่า 2 ครั้ง ยิ่งดีโดยเริ่มผสมพันธุ์ในวันที่สองของการเป็นสัตด

แม่สุกรที่คลอดลูกแล้ว ควรหย่านมเมื่อลูกอายุ 4 สัปดาห์ และแม่สุกรจะเป็นสัตดหลังจากหย่านมภายใน 3-10 วัน ทำการผสมพันธุ์ต่อได้เลย แม่สุกรควรให้ลูกปีลະไม่ต่ำกว่า 2 ครอก และผลิตลูกได้ไม่ต่ำกว่า 15 ตัว/แม่/ปี ในแม่สุกรพันธุ์แท้ ส่วนแม่สุกรลูกผสม (แลนด์เรช-ลาร์จไวท์) ควรผลิตลูกได้ไม่ต่ำกว่า 18 ตัว/แม่/ปี แม่สุกรที่ผสมไม่ติดเกิน 3 ครั้ง ควรคัดออกจากรุ่ง

การผสมพันธุ์มี 2 วิธี

1. ผสมพันธุ์ตามธรรมชาติ โดยใช้พ่อพันธุ์ผสมกับแม่พันธุ์ ในอัตราส่วน 1:10 พ่อพันธุ์สามารถใช้ ผสมพันธุ์จนถึงอายุ 3-4 ปี ขบวนการที่พ่อพันธุ์ขึ้นทันและผสมตัวเมีย ใช้เวลา 3-20 นาที จะมีอัตราสูงกว่าการผสม 250 ซีซี. หรือระหว่าง 100-500 ซีซี. การหลั่งน้ำเชื้อจะประกอบด้วย 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ใช้เวลา 1-5 นาที สุกรเพศผู้จะขับน้ำหล่อลื่นใสๆ ออกมาก ซึ่งไม่มีตัวอสุจิอยู่เลย มีประมาณ 5-20% ของน้ำเชื้อทั้งหมด ระยะที่ 2 ใช้เวลา 2-5 นาที ต่อจากระยะแรก ซึ่งเป็นส่วนที่มีตัวอสุจิประมาณ 30-50% ของน้ำเชื้อทั้งหมด ระยะที่ 3 ใช้เวลา 3-4 นาที ต่อจากระยะที่ 2 ซึ่งเป็นส่วนที่มีตัวอสุจิน้อย จะฟอร์มเป็นเม็ดสากุก้ามไม่ให้อสุจิไหลออกมากจากช่องคลอด ซึ่งมีประมาณ 40-60% ของน้ำเชื้อทั้งหมด เมื่อหมดระยะที่ 3 เล้า ตัวผู้จะค่อยๆ ลงจากตัวเมีย



2. ผสมเทียม โดยการฉีดน้ำเชื้อสุกรตัวผู้เข้าในอวัยวะเพศเมียในขณะที่ตัวเมียเป็นสัดเต็มที่ ในปัจจุบันฟาร์มสุกรขนาดใหญ่ และขนาดกลางนิยมใช้การผสมเทียมมาก เนื่องจากมีข้อดีหลายข้อ เช่น ได้พ่อพันธุ์ที่มีคุณภาพดี ประหยัดค่าอาหารที่ใช้เลี้ยงพ่อพันธุ์ ผสมเทียมใช้พ่อพันธุ์กับแม่พันธุ์ในอัตราส่วน 1:50 และเกย์ตระร้ายอย่างสามารถทำการผสมเทียมเองได้ วิธีการผสมเทียมง่ายและสะดวก หน่วยงานของกรมปศุสัตว์ เช่น ศูนย์วิจัยการผสมเทียมมีบริการผสมเทียมในสุกรและที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์น้ำราชสีมา จำหน่ายน้ำเชื้อสุกรในราคากูก



การปฏิบัติเลี้ยงดู และการจัดการสุกร

1. การจัดการพ่อสุกร พ่อสุกรที่จะนำมาใช้เป็นพ่อพันธุ์ ควรมีอายุ 8 เดือนขึ้นไป ให้อาหารโปรดีน 16 เปอร์เซ็นต์ ใหกินอาหารวันละ 2 กิโลกรัม ขึ้นอยู่กับสภาพของพ่อสุกรด้วยว่าไม่ อ้วนและผอมเกินไป

2. การจัดการแม่สุกร ให้อาหารโปรดีน 16 เปอร์เซ็นต์ ใหกินอาหารวันละ 2 กิโลกรัม แม่สุกรสาวควรมีอายุ 7-8 เดือน น้ำหนัก 100-120 กิโลกรัม จึงนำมาผสมพันธุ์ (เป็นสัดครึ่งที่ 2-3) ผสมพันธุ์ 2 ครั้ง (เช้า-เช้า, เย็น-เย็น) เมื่อผสมพันธุ์แล้วควรลดอาหารให้เหลือ 1.5-2 กิโลกรัม เมื่อตั้งท้องได้ 90-108 วัน ควรเพิ่มอาหารเป็น 2-2.5 กิโลกรัม และเมื่อตั้งท้องได้ 108 วัน-คลอดลูก ใหลดอาหารลงเหลือ 1-1.5 กิโลกรัม (ปกติสุกรจะตั้งท้องประมาณ 114 วัน) แม่สุกรควรอยู่ในสภาพปานกลางคือไม่อ้วน หรือผอมเกินไป แม่สุกร จะให้ลูกดีที่สุดในครอกที่ 3-5 และควรคัดแม่สุกรออกในครอกที่ 7 หรือ 8 (แม่สุกรให้ลูกเกินกว่าครอกที่ 7 ขึ้นไป มักจะให้จำนวนลูกสุกรแรกคลอดน้อยชีวิต และจำนวนลูกสุกรหาย่านมลดลง)

2.1 การจัดการแม่สุกรก่อนคลอด ระวังอย่าให้แม่สุกรเจ็บป่วย หรือท้องผูก การจัดการดังนี้

2.1.1 แม่สุกรก่อนคลอด 7 วัน ใหอาบน้ำด้วยสบู่ทำความสะอาด สะอาดแม่สุกร โดยเฉพาะร่วนม บันท้าย อวัยวะเพศ และพ่นอาบด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค (ละลายน้ำ ตามอัตราส่วน) และพ่นยาฆ่าพยาธิภายนอก และนำเข้าห้องคลอด

2.1.2 ก่อนแม่สุกรคลอด 4 วัน ควรลดอาหารลงเหลือ 1-1.5 กิโลกรัม/วัน ควรผสมรำลีเอียดเพิ่มอีก 20 เปอร์เซ็นต์ในอาหาร โดยให้แม่สุกรกิน 4-6 วันก่อนคลอด หรือผสมแมกนีเซียมชัลเฟต์ (ดีเกลือ) ประมาณ 10 กรัม โดยคลุกอาหารให้ทั่วให้แม่สุกรกินวันละครั้ง 1-3 วันก่อนคลอด เพื่อป้องกันแม่สุกรท้องผูก ช่วยลดปัญหาแม่สุกรคลอดยาก

2.1.3 แม่สุกรปกติตั้งท้อง 114 วัน \pm 3 วัน ถ้าแม่สุกรตั้งท้อง 114 วันแล้วยังไม่คลอด หากเกรงว่าจะมีปัญหาคลอดยาก ให้นัดด้วยฮอร์โมน

อุทาไอล์ท 2 ชีซี. (Hormone Prostaglandin F_{2α}) เข้ากล้ามเนื้อแม่สุกร จะช่วยทำให้แม่สุกรคลอดลูกภายใน 36 ชั่วโมง เป็นการป้องกันลูกสุกรตาย เนื่องจากการพิดปกติของการตั้งท้องของแม่สุกร

2.1.4 ดูแลแม่สุกรอย่างใกล้ชิดอย่าให้แม่สุกรป่วย เช่น สังเกตراجอาหารว่าแม่สุกรกินอาหารหมดหรือไม่ ถ่ายอุจจาระเป็นเม็ดกระสุน ท้องเสีย หอบแรง เป็นต้น ถ้าแม่สุกรป่วยก็ควรรักษาตามอาการ

2.1.5 คอกคลอด ก่อนนำแม่สุกรเข้าคอกคลอด คอกคลอดต้องสะอาด ráดหรือพ่นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และรอยปูนขาว ต้องมีการพักคอกไว้อย่างน้อย 7 วัน ซึ่งจะเป็นการตัดวงจรของเชื้อโรค



3. การจัดการลูกสุกรเมื่อคลอด แม่สุกรก่อนคลอด 24 ชั่วโมง เมื่อบีบเต้านมจะมีน้ำนมไหลออกมากจากเต้านม ลูกสุกรแรกรคลอดควรดูแลและปฏิบัติตามนี้

3.1 ใช้ผ้าที่สะอาดหรือฟางเช็ดตัวลูกสุกรให้แห้ง ควรอาบน้ำเมื่อกินปากและในจมูกออก



3.2 การตัดสายสะดื้อ ใช้ด้ายผูกสายสะดื้อให้ห่างจากพื้นท้องประมาณ 1-2 นิ้ว ตัดสายสะดื้อด้วยกรรไกร การอยแพลด้วยทิงเจอร์ไอโอดีน เพื่อฆ่าเชื้อโรค

3.3 ตัดเขี้ยวออกให้หมด (เขี้ยวมี 8 ซี. ข้างบน 4 ซี. ข้างล่าง 4 ซี.) การตัดเขี้ยวให้ใช้กรรไกรตัดเขี้ยวที่มีขายตามร้านขายอุปกรณ์ การเลี้ยงสุกร หรือใช้คีมปอกสายไฟหรือกรรไกร ตัดเล็บขนาดใหญ่ การตัดเขี้ยวเพื่อป้องกันลูกสุกรกัดเต้านมแม่สุกรเป็นแผลในขณะแบ่งครุณม





ไฟกอกลูกสุกร



กล่องกระสอบ

3.4 รีบนำลูกสุกรกินนมน้ำเหลืองจากเต้านมแม่สุกร ในนมน้ำเหลืองจะมีสารอาหารและภูมิคุ้มกันโรค ปกตินมน้ำเหลืองจะมีอยู่ประมาณ 36 ชั่วโมง หลังคลอด จากนั้นจะเปลี่ยนเป็นนมธรรมดาน้ำ



ใช้กล่องกระสอบแทนไฟกอก

4. การจัดการลูกสุกรแรกคลอด-หย่านม

4.1 ลูกสุกรในระยะ 15 วันแรก

ต้องการความอบอุ่น ต้องจัดหาไฟกอก ใช้หลอดไฟขนาด 100 แรงเทียน มีโคมไฟ อุณหภูมิประมาณ 32-34 องศาเซลเซียส หลังจากผ่าน 15 วันแรก ไปแล้วใช้กล่องกระสอบแทนไฟกอกซึ่งจะลดการสิ้นเปลืองค่าไฟฟ้า ลูกสุกรจะเข้าไปนอนในกล่องกระสอบด้วยความอบอุ่น (กล่องกระสอบทำด้วยโครงเหล็กเส้น 3 ทุน ยาว 80 เซนติเมตร กว้าง 35 เซนติเมตร สูง 35 เซนติเมตร แล้วรวมด้วยกระสอบปลายข้าว)



4.2 ลูกสุกรอายุ 1-3 วัน ให้น้ำด้วยนมหรืออาหารสุกร เจ้ากล้ามเนื้อตัวละ 2 ซีซี. เพื่อป้องกันโรคโลหิตจาง

4.3 ลูกสุกรอายุ 10 วัน เริ่มให้อาหารสุกรนมหรืออาหารสุกรอ่อน (อาหารเลี้ยวเราะ) เพื่อฝึกให้ลูกสุกรกินอาหาร โดยให้กินทีละน้อยแต่บ่อยครั้ง

4.4 ลูกสุกรทั่วไปย่างเมื่ออายุ 28 วัน (4 สัปดาห์)

5. การจัดการลูกสุกรเมื่อย่าง

5.1 หย่านมลูกสุกรเมื่ออายุ 28 วัน น้ำหนักประมาณ 6 กิโลกรัม ควรขยายแม่สุกรออกไปก่อนให้ลูกสุกรอยู่ในคอกเดิมสัก 3-5 วัน แล้วจึงขยายลูกออกไปคอกอนุบาล เพื่อป้องกันลูกสุกรเครียด และควรใช้วิตามินหรือยาปฏิชีวนะละลายนำให้ลูกสุกรกินหลังจากหย่านมประมาณ 3-5 วัน

5.2 ลูกสุกรอายุ 6 สัปดาห์ ให้น้ำดีวัคซีนป้องกันโรคพิวรรต์สุกร และฉีดวัคซีนช้ำทุก ๆ 6 เดือน ในสุกรพ่อแม่พันธุ์ (วัคซีนมีความคุ้มโรคได้ประมาณ 6-12 เดือน)

5.3 ลูกสุกรอายุ 7 สัปดาห์ ให้น้ำดีวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และฉีดวัคซีนช้ำทุก ๆ 4-6 เดือน ในสุกรพ่อแม่พันธุ์ (วัคซีนมีความคุ้มโรคได้ประมาณ 4-6 เดือน)

5.4 ลูกสุกรอายุ 2 เดือนครึ่ง ควรให้ยาถ่ายพยาธิ และให้ช้ำหลังจากให้ครั้งแรก 21 วัน ในสุกรพ่อแม่พันธุ์ควรถ่ายพยาธิทุก ๆ 6 เดือน

6. การจัดการแม่สุกรหลังคลอด

6.1 ฉีดยาปฏิชีวนะให้แม่สุกรหลังคลอดทันทีติดต่อกันเป็นเวลา 1-2 วัน เพื่อป้องกันมดลูกอักเสบ (ยาเพนสเตอร์ีป, แอมพิชิลิน, เทอร์รามัยซิน เป็นต้น)

6.2 หลังคลอด 1-3 วัน ควรให้อาหารแม่สุกรแต่น้อย (วันละ 1-2 กิโลกรัม) และเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนให้อาหารเต็มที่เมื่อหลังคลอด 14 วัน (ให้อาหารวันละ 4-6 กิโลกรัม) หรือหากแม่สุกรมีลูกเกิน 10 ตัวขึ้นไป อาจจะให้อาหารแม่สุกรเลี้ยงลูก 8-10 กิโลกรัมต่อ

วัน หลังจากคลอด 14-28 วัน หรือจนกระทั้งแม่สุกรหย่านม ระวังอย่าให้แม่สุกรพอมเมื่อยหย่านม ซึ่งจะมีผลทำให้แม่สุกรไม่สมบูรณ์พันธุ์ และโกร姆มาก แม่สุกรหลังหย่านมควรขังรวมกันคอกคละประมาณ 2-5 ตัว



การขังแม่สุกรรวมกัน

(ขนาดใกล้เคียงกัน) เพื่อให้เกิดความเครียดจะเป็นสัดได้ง่ายและจะเป็นสัดภายใน 3-10 วัน ถ้าแม่สุกรเป็นสัดให้ทำการผสมพันธุ์ได้เลย

6.3 ปัญหาแม่สุกรไม่เป็นสัด สุกรสาวหรือแม่สุกรหลังจากหย่านมแล้วไม่เป็นสัด หรือเป็นสัดเงี่ยน จะพบเห็นได้บ่อย ๆ มีวิธีแก้ไขดังนี้

6.3.1 ต้อนแม่สุกรมาจั่งรวมกัน เพื่อให้เกิดความเครียด

6.3.2 เลี้ยงพ่อสุกรอยู่ใกล้ ๆ หรือให้พ่อสุกรเข้ามาสัมผัสแม่สุกรบ้าง

6.4 การผสมพันธุ์เพื่อให้ได้ลูกดก

6.4.1 คัดเลือกสายแม่พันธุ์ เช่น ควรใช้แม่พันธุ์ลาร์จไวท์, แม่พันธุ์แอลนเดอร์เรช หรือลูกผสมแلنด์เรช-ลาร์จไวท์

6.4.2 ผสมเมื่อแม่สุกรเป็นสัดเต็มที่ ซึ่งจะทำให้ไข่ตกลมากจะอยู่ในช่วงวันที่ 2-3 ของการเป็นสัด ผสม 2 ครั้ง ห่างกัน 24 ชั่วโมง (เช้า-เช้า หรือ เย็น-เย็น)

6.4.3 ถ้ามีพ่อสุกรหลายตัว และผลิตสุกรขุนเป็นการค้า ควรใช้พ่อสุกร 2 ตัว ผสมสลับกัน จะให้ลูกจำนวนมากขึ้น

6.4.4 แม่สุกรหลังจากหย่านมแล้ว 1 วัน ควรเพิ่มอาหารให้จนกระทั้งเป็นสัด โดยให้อาหารวันละ 3-4 กิโลกรัม (ไม่เกิน 15 วัน) เพื่อทำให้ไข่ตกลมากขึ้น และเมื่อผสมพันธุ์แล้ว ให้ลดอาหารแม่สุกรลงเหลือวันละ 1.5-2 กิโลกรัม ตามปกติ

อาหาร และการให้อาหารสุกร

สุกรเป็นสัตว์กระเพาะเดี่ยว ไม่สามารถย่อยอาหารที่มีเยื่อไขมากได้ดี เหมือนสัตว์กระเพาะรวม (โค กระนือ) ระบบการย่อยอาหารมีหน้าที่ย่อยอาหารที่สุกรกินเข้าไปให้แตกตัวจนมีขนาดเล็กลง เพื่อสามารถดูดซึมไปใช้เสริมสร้างส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย สุกรมีความต้องการโภชนาะที่ครบถ้วน คำว่าโภชนาณนั้นหมายถึง สารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายประกอบด้วย 6 ชนิดคือ

1. น้ำ ให้น้ำสะอาดแก่สุกรตลอดเวลา ปกติสุกรจะกินน้ำประมาณ 5-20 ลิตรต่อวัน ตามขนาดของสุกร

2. โปรตีน มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของสุกร ช่วยสร้างเนื้อเยื่อ และเป็นส่วนประกอบหลักที่สำคัญของร่างกายสัตว์ โปรตีนประกอบด้วย กรดอะมิโนอยู่ประมาณ 30 ชนิด กรดอะมิโนที่จำเป็น 10 ชนิด ได้แก่ ไลซีน เมทีโอนีน ทริพโต芬 อาร์ยินิน อิสทิดีน ไอโซລูชีน ลูชีน อาลานีน ทีโอนีน และวาลีน

3. คาร์บอไฮเดรท เป็นอาหารที่ให้พลังงานที่เรียกว่า “ ” ว่าอาหาร แป้งและน้ำตาล รวมไปถึงเยื่อไขที่เป็นส่วนประกอบในวัตถุดินอาหารสัตว์

4. ไขมัน เป็นอาหารที่ให้พลังงาน เช่นเดียวกับคาร์บอไฮเดรท แต่ ให้พลังงานสูงกว่าคาร์บอไฮเดรท 2.25 เท่า

5. แร่ธาตุ แร่ธาตุเป็นสิ่งจำเป็นมากที่สุด สำหรับการทำงานของ ร่างกาย มีหน้าที่เสริมสร้างกระดูก และด้านท่านโรค ในร่างกายสุกรมีแร่ธาตุ มากกว่า 40 ชนิด ส่วนที่จำเป็นและสำคัญต่อร่างกาย ได้แก่ แคลเซียม พофฟอรัส โซเดียม คลอเรน เหล็ก ทองแดง ไอโอดีน กำมะถัน สังกะสี แมงกานีส โคงอล์ โปรดัสเซียม แมกนีเซียม และซิลิเนียม

6. ไวดามิน เป็นสารประกอบอินทรีย์ มีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโต และการดำรงชีวิต ไวดามินมีมากถึง 50 ชนิด ส่วนที่จำเป็นในร่างกายสัตว์ ได้แก่ ไวดามิน เอ ดี อี บี2 (ไรโบฟลาวิน) ในอาชีน กรดแพนโทಥินิก โคลีน ไบโอดิน และบี12 เป็นต้น

วัตถุดินอาหารสัตว์

1. อาหารประเภทโปรตีน ได้มาจากพืชและสัตว์ มีรายละเอียดดังนี้

1.1 อาหารโปรตีนที่ได้จากพืช ได้แก่

1.1.1 กากถั่วเหลือง เป็นอาหารโปรตีนจากพืชที่ดีที่สุด ได้มา จากถั่วเหลืองที่สกัดน้ำมันออก มีโปรตีนอยู่ระหว่าง 40-44 เปอร์เซ็นต์ ใช้เป็น อาหารสุกรในรูปของกากถั่วเหลืองสกัดน้ำมันด้วยสารเคมี (เป็นเกล็ด, แวร์)

และรูปของากถัวเหลืองอัดน้ำมัน (แผ่นเกีก) โปรดีนจากากถัวเหลืองมีกรดอะมิโนที่จำเป็นสมดุลย์ หมายในการใช้เลี้ยงสุกรทุกระยะการเจริญเติบโตในเม็ดถัวเหลืองคินไม่เหมาะสมแก่การนำมาใช้เลี้ยงไก่ และสุกร ทั้งนี้ เพราะเม็ดถัวเหลืองดินมีสารพิษชนิดที่เรียกว่า “ตัวยับยั้งทริปซิน” (Trypsin inhibitor) อยู่ด้วย สารพิษนี้จะมีผลไปขัดขวางการย่อยโปรดีนในทางเดินอาหารถัวเหลืองที่เหมาะสมสำหรับใช้ผสมอาหารเลี้ยงสุกรน อาหารครีฟฟีด อาหารสุกรอ่อน อาหารสุกรเล็ก ได้แก่ถัวเหลืองอบไวน์สูง (ถัวเหลืองซึ่งผ่านกระบวนการอบให้สุก โดยไม่ได้สกัดน้ำมันออกมีโปรดีน 38%) ส่วนสุกรเล็กและสุกรขนาดอื่นทั่วไปนิยมใช้กากถัวเหลืองสกัดน้ำมันด้วยสารเคมี

1.1.2 กากถัวลิสต์ เป็นผลิตผลโดยได้จากการสกัดน้ำมันออกมีโปรดีนอยู่ประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ การใช้กากถัวลิสต์ย่างเดียวในอาหาร จะทำให้สุกรเจริญเติบโตช้า เนื่องจากความไม่สมดุลย์ของกรดอะมิโน ดังนั้น จึงควรใช้กากถัวลิสต์ร่วมกับกากถัวเหลือง และปลาป่นด้วย การเก็บรักษา กากถัวลิสต์ ถ้ามีความชื้นสูงจะเสียเร็วเนื่องจากถัวลิสต์เป็นพืชที่มีน้ำมันมาก จึงเก็บไวนานไม่ได้ จะเกิดการเหม็นหืนและมีราเกิดได้ง่าย ซึ่งจะสร้างสารพิษ “อะฟลาทิอกซิน” ซึ่งเป็นอันตรายต่อสัตว์ ดังนั้นควรจะเลือกใช้แต่ กากถัวลิสต์ที่ใหม่ มีไขมันต่ำ และควรเก็บไวในที่ไม่ร้อนและชื้น

1.1.3 กากเมล็ดฝ้าย เป็นผลผลิตโดยได้จากการสกัดน้ำมันออกจากเมล็ดฝ้าย จะมีโปรดีนประมาณ 40-45 เปอร์เซ็นต์ กากเมล็ดฝ้าย มีสารพิษที่มีชื่อว่า “ก็อสซิปอล” ซึ่งเป็นสารที่ละลายในน้ำมัน จึงเป็นเหตุให้การใช้อยู่ในขีดจำกัดไม่ควรเกิน 10 เปอร์เซ็นต์ การใช้ในระดับสูงจะทำให้การเจริญเติบโตช้าลง นอกจากนี้การใช้กากเมล็ดฝ้ายควรจะเดิมกรดอะมิโน ไลซีนสังเคราะห์ลงไปด้วย

1.1.4 กากมะพร้าว เป็นวัตถุผลอยได้จากการโรงงานสกัดน้ำมันมะพร้าว ถ้าอัดน้ำมันออกใหม่ๆ จะมีกลิ่นหอมน่ากิน มีโปรดีนประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ ถ้าใช้กากมะพร้าวในระดับสูงเลี้ยงสุกรระยะการเจริญเติบโตและชุน จะทำให้การเจริญเติบโตของสุกรช้า ดังนั้นควรจะใช้ในระดับ 10-15 เปอร์เซ็นต์

1.1.5 กากเมล็ดนุ่น เมื่อสกัดน้ำมันออกแล้วจะมีโปรตีนประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ เหมาะที่จะใช้เลี้ยงสุกรรุ่นมากกว่าสุกรระยะอื่น ในปริมาณไม่เกิน 15 เปอร์เซ็นต์ กากเมล็ดนุ่นจะทำให้มันจับแข็งตามอวัยวะภายในร่างกายต่างๆ เช่น ลำไส้ เป็นต้น

1.2 อาหารโปรตีนที่ได้จากสัตว์ ได้แก่

1.2.1 ปลาป่น เป็นอาหารโปรตีนที่ได้จากสัตว์ที่ดีที่สุด มีโปรตีนอยู่ระหว่าง 50-60 เปอร์เซ็นต์ คุณภาพของปลาป่นขึ้นอยู่กับชนิดของปลาที่ใช้ทำปลาป่น และสิ่งอื่นประปามากน้อยแค่ไหน รวมทั้งกรรมวิธีการผลิตปลาป่น เช่น ถ้าให้ความร้อนสูง ทำให้คุณค่าทางอาหารต่ำลง ปริมาณกรดอะมิโนในปลาป่นจะต่ำลงเรื่อยๆ ปลาป่นมีคุณค่าทางอาหารสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับโปรตีนจากพืช แต่ถ้าใช้ในอาหารปริมาณสูงและใช้เลี้ยงสุกรตลอดระยะเวลาสั้นๆ จะทำให้เนื้อมีกลิ่นควรจัด ดังนั้นจึงควรใช้ในระหว่าง 3-15 เปอร์เซ็นต์

1.2.2 เลือดแท้ ได้จากโรงฆ่าสัตว์ มีโปรตีนค่อนข้างสูง 80 เปอร์เซ็นต์ เป็นโปรตีนที่ย่อยยาก ทำให้การเจริญเติบโตของสุกรต่ำลง ควรใช้ร่วมกับอาหารโปรตีนชนิดอื่นๆ ไม่ควรใช้เกิน 5 เปอร์เซ็นต์

1.2.3 หางนมแพง มีโปรตีนปริมาณ 30-40 เปอร์เซ็นต์ และเป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายแต่มีราคาแพง จึงนิยมใช้กับอาหารลูกสุกรเท่านั้น

1.2.4 ขนไก่ป่น เป็นอาหารที่ได้จากผลผลิตไก่ ได้จากโรงงานฆ่าไก่ มีโปรตีนค่อนข้างสูงถึง 85 เปอร์เซ็นต์ แต่มีคุณค่าทางอาหารเพียงเล็กน้อย เนื่องจากเป็นโปรตีนที่ไม่สามารถย่อยได้

2. อาหารประเภทการโน้มไข่เดรท (แป้งและน้ำตาลให้พลังงาน)

2.1 ปลายข้าว ปลายข้าวและรำลະເອີດเป็นผลิตผลโดยได้จากการสีข้าว ปลายข้าวมีโปรตีน 8 เปอร์เซ็นต์ เป็นวัตถุคุณอาหารที่เหมาะสมในการเลี้ยงสัตว์ ทั้งนี้ปลายข้าวประกอบไปด้วยแป้งที่ย่อยง่ายเป็นส่วนใหญ่ มีไขมันและเยื่อไขในระดับต่ำ (1.0 เปอร์เซ็นต์) เก็บไว้ได้นาน ตรวจสอบ

การปลอมปนได้ง่าย ปลายข้าวที่ใช้เลี้ยงสุกร ควรเป็นปลายข้าวเม็ดเล็ก ปลายข้าวที่มีขนาดใหญ่ควรจะต้องบดให้มีขนาดเล็กลงก่อน แล้วจึงค่อยใช้ ผสมอาหาร นอกจากนี้ยังมีปลายข้าวนึ่ง (ข้าวเปลือกที่เปลยนน้ำ หรือมีความชื้นสูง นำมาอบเผาความชื้นออก สีเอาเปลือกออก ปลายข้านึ่งมีสีเหลืองอ่อนหรือ สีขาวปนเหลือง) นำมาเลี้ยงสุกรทดแทนปลายข้าวได้ แต่ต้องพิจารณาเรื่อง คุณภาพด้วย เช่น การปนของเมล็ดข้าวสีดำ ซึ่งเมล็ดข้าวสีดำมีคุณภาพไม่ดี

2.2 รำลエียด มีโปรตีนประมาณ 12 เปอร์เซ็นต์ รำลエียด มีไขมันเป็นส่วนประกอบอยู่ในระดับค่อนข้างสูง และเป็นไขมันที่หินได้ง่ายใน สภาพที่อากาศร้อน หากเก็บไว้เกิน 60 วันไม่เหมาะสมที่จะนำมาใช้เลี้ยงสัตว์ รำลエียดมักจะมีการปลอมปนด้วยแกลบปัน ละอองข้าวหรือดินข้าวปัน ทำให้ คุณค่าทางอาหารต่ำลง ถ้าเป็นรำลขานาปรังควรระวังเรื่องยาฆ่าแมลงที่ปะปนมา ในระดับสูง รำลสักด้น้ำมันได้จากการนำเอารำลエียดไปสักดเอาไขมันออก ใช้ทดแทนรำลエียดได้ดีแต่ต้องระวังเรื่องระดับพลังงาน เพราะรำลสักด้น้ำมัน มีค่าพลังงานใช้ประโยชน์ได้ต่ำกว่ารำลエียด รำลエียดมีเยื่อใยเป็นส่วนประกอบ ในระดับสูง จึงมีลักษณะฟาม ไม่ควรใช้เกิน 30 เปอร์เซ็นต์ในสูตรอาหาร รำลエียดมีคุณสมบัติเป็นยาระบาย โดยเฉพาะสูตรอาหารแมสุกรอุ่นห้องและ เลี้ยงลูก จะช่วยลดปัญหาแมสุกรห้องผูก

2.3 ข้าวโพด มีโปรตีนประมาณ 8 เปอร์เซ็นต์ และน้ำเยื่อไอย้อยู่ใน ระดับต่ำ เป็นวัตถุคุณอาหารที่เหมาะสมในการผสมเป็นอาหารสุกร ข้าวโพดที่ดี ควรเป็นข้าวโพดที่บดอย่างละเอียด ไม่มีมอดกิน ไม่มีสิ่งปลอมปน และที่สำคัญ ที่สุดจะต้องไม่มีขี้รา (สารพิษอะฟลาทิอกซิน) และไม่มียาฆ่าแมลงปลอมปน ข้าวโพดสามารถใช้ทดแทนปลายข้าวได้ ข้อเสียในการใช้ข้าวโพดคือมีเชื้อรา และยาฆ่าแมลง เนื่องจากการเก็บเกี่ยว และการเก็บรักษาไม่ดีพอ

2.4 ข้าวฟ่าง มีโปรตีนประมาณ 11 เปอร์เซ็นต์ ข้าวฟ่างโดยทั่วไป จะมีสารแทนนิน ซึ่งมีรสฝาดอยู่ในระดับสูง สารแทนนินมีผลทำให้การย่อยได้ ของโปรตีนและพลังงานลดลง ดังนั้นจึงเป็นข้อจำกัดในการใช้ข้าวฟ่าง

2.5 มันสำปะหลัง ใช้เลี้ยงสัตว์ในรูปมันสำปะหลังตามแห้งที่เรียกว่า มันเส็น มีโปรตีนประมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ มีแป้งมาก มีเยื่อไข่ประมาณ 4 เปอร์เซ็นต์ ข้อเสียของการใช้มันเส็น คือ จะมีลำต้น, เหง้า และดินรายปนมาด้วย ดังนั้นจึงควรเลือกใช้มันเส็นที่มีคุณภาพดี เกรดใช้เลี้ยงสุกร ส่วนหัวมันสำปะหลังสดไม่ควรนำมาใช้เป็นอาหารสัตว์ เพราะมีสารพิษกรดไฮโดรไไซยาโนิกในระดับสูงมาก และเป็นอันตรายต่อสัตว์ได้ วิธีการลดสารพิษทำได้ 2 วิธีคือ

a. ทำเป็นมันเส็น โดยหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ผึ้งแಡดอย่างน้อย 3 แಡด มันเส็นที่มีคุณภาพดี สามารถใช้กดแทนปลายข้าวได้ ในกรณีปลายข้าวราคานึ่ง และมันเส้นราคากูก (ปลายข้าว 1 กิโลกรัม เท่ากับมันเส็น 0.85 กิโลกรัม + กากถั่วเหลือง 0.15 กิโลกรัม)

b. ทำเป็นมันมัก หมักในหม้อน้ำ หรือในถุงพลาสติก คราวหมักอย่างน้อย 1 เดือน ซึ่งจะลดปริมาณสารพิษกรดไฮโดรไไซยาโนิกให้ออกไปในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุกร

3. อาหารประเภทไขมัน

ไขมันจากสัตว์ ได้แก่ ไขมันวัว ไขมันสุกร ส่วนไขมันจากพืช ได้แก่ น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันปาล์ม น้ำมันรำ เป็นต้น สาเหตุที่ต้องใช้ไขมันในสูตรอาหาร เพื่อเพิ่มระดับพลังงานในสูตรอาหารนั้นให้สูงขึ้น ส่วนใหญ่ใช้ในอาหารสุกรเล็ก โดยเดิม 2-5 เปอร์เซ็นต์ในอาหาร ข้อเสียของไขมันมักจะมีกลิ่นหืน และเก็บไว้ได้ไม่นาน

4. อาหารประเภทแร่ธาตุ และวิตามิน

4.1 กระดูกป่น เป็นแหล่งของธาตุแคลเซียมและฟอสฟอรัสที่ดีมาก แต่มีคุณภาพไม่แน่นอน

4.2 ไดแคลเซียมฟอสเฟต ให้ธาตุแคลเซียมและฟอสฟอรัสที่นำมาจากกระดูก หรือทำจากหิน โดยนำเอาหินฟอสเฟตมาเผา ปกติจะใช้ไดแคลเซียมฟอสเฟตที่มีฟอสฟอรัส 18 เปอร์เซ็นต์ (P 18) หรือสูงกว่า

4.3 เปลือกหอยบด ให้ร้าตุแคลเซียมอย่างเดียว

4.4 หัวไวตามินแร่ธาตุ หรือพรีมิกซ์ เป็นส่วนผสมของไวตามิน และแร่ธาตุปเลือกย่อยทุกชนิดที่สูตรต้องการ และพร้อมที่จะนำมาผสมกับวัตถุคิดเป็นอาหารสัตว์อย่างอื่นได้ทันที พรีมิกซ์มีข่ายตามท้องตลาดทั่วไป

การให้อาหารสุกรระยะต่างๆ

1. ลูกสุกรระยะดูดนมแม่ เริ่มให้อาหารสุกรนมโปรดีน 22 เปอร์เซ็นต์ หรืออาหารสุกรอ่อนโปรดีน 20 เปอร์เซ็นต์ เมื่อลูกสุกรมีอายุ 10 วัน ถึงหย่านม (หย่านม 28 วัน) และให้อ่ออึกประมาณ 3 วัน หลังจากหย่านมแล้ว

2. ลูกสุกรระยะหย่านม (หย่านม 28 วัน น้ำหนักประมาณ 6 กิโลกรัม) ให้อาหารสุกรอ่อนโปรดีน 20 เปอร์เซ็นต์ จนถึงอายุ 2 เดือน (น้ำหนักประมาณ 12-20 กิโลกรัม)

3. สุกรระยะน้ำหนัก 20-35 กิโลกรัม ให้อาหารโปรดีน 18 เปอร์เซ็นต์ โดยให้สุกรกินอาหารเต็มที่ สุกรจะกินอาหารวันละ 1-2 กิโลกรัม

4. สุกรระยะน้ำหนัก 35-60 กิโลกรัม ให้อาหารโปรดีน 16 เปอร์เซ็นต์ สุกรจะกินอาหารวันละ 2-2.5 กิโลกรัม

5. สุกรระยะน้ำหนัก 60 กิโลกรัม-ส่งตลาด ให้อาหารโปรดีน 14-15 เปอร์เซ็นต์ สุกรจะกินอาหารวันละ 2.5-3.5 กิโลกรัม

6. การให้อาหารสุกรพันธุ์ทดลอง สุกรตัวที่ต้องการจะเก็บไว้ทำพันธุ์ (ยกเว้นสุกรชุน, สุกรทดลองพันธุ์) ควรจำกัดอาหารเพื่อไม่ให้อ้วนเกินไป เมื่อสุกรน้ำหนักประมาณ 60 กิโลกรัม ใช้อาหารโปรดีน 16 เปอร์เซ็นต์ ให้อาหารวันละ 2-2.5 กิโลกรัม

7. การให้อาหารสุกรพ่อพันธุ์ ให้อาหารโปรดีนประมาณ 15-16 เปอร์เซ็นต์

- พ่อพันธุ์ตัวใหญ่ 150 กิโลกรัมขึ้นไป ให้อาหารวันละ 2-2.5 กิโลกรัม
- พ่อพันธุ์ตัวเล็ก 100-150 กิโลกรัม ให้อาหารวันละ 2 กิโลกรัม

8. การให้อาหารแม่สุกรอัมท้อง ให้อาหารโปรดีนประมาณ 15-16 เปอร์เซ็นต์ แม่สุกรจะตั้งท้องประมาณ 114 วัน ควรให้อาหารดังนี้

- แม่สุกรสาวทดแทนให้อาหารวันละ 2 กิโลกรัม
- แม่สุกรหลังจากผสมพันธุ์ให้อาหารวันละ 1.5-2 กิโลกรัม
- แม่สุกรตั้งท้อง 0-90 วัน ให้อาหารวันละ 2 กิโลกรัม
- แม่สุกรตั้งท้อง 90-108 วัน ให้อาหารวันละ 2-2.5 กิโลกรัม^(ขึ้นอยู่กับสภาพแม่สุกรอ่อนหรือผอมด้วย)
- แม่สุกรตั้งท้อง 108-114 วัน ให้อาหารวันละ 1-1.5 กิโลกรัม^(เมื่อตั้งท้องได้ 108 วัน ให้ย้ายเข้าคอกคลอด)

9. การให้อาหารแม่สุกรหลังคลอด ให้อาหารโปรดีนประมาณ 16 เปอร์เซ็นต์

- คลอดลูกแล้ว 0-3 วัน ให้อาหารวันละ 1-2 กิโลกรัม
- คลอดลูก 3-14 วัน ให้อาหารวันละ 2-3.5 กิโลกรัม
- คลอดลูก 14 วันขึ้นไป ให้อาหารเต็มที่เท่าที่แม่สุกรจะกินอาหารได้ หรือประมาณวันละ 4-6 กิโลกรัม ในกรณีที่แม่สุกรมีลูก 7 ตัวขึ้นไป (ควรให้อาหารแม่สุกรวันละ 3 ครั้ง เป็นอย่างน้อย ดูตามสภาพของแม่สุกร ระวังอย่าให้แม่สุกรผอม)

10. การให้อาหารแม่สุกรหลังหย่านม ให้อาหารโปรดีนประมาณ 15-16 เปอร์เซ็นต์

- แม่สุกรหย่านมในวันแรก ให้อาหารวันละ 1-1.5 กิโลกรัม
- แม่สุกรหย่านมจาก 2 วันขึ้นไป จนถึงแม่สุกรเป็นสัด (แต่ไม่ควรเกิน 15 วัน) ให้อาหารวันละ 3-4 กิโลกรัม เพื่อให้แม่สุกรสมบูรณ์พันธุ์เร็วขึ้นและเพิ่มการตกไข่
- แม่สุกรเป็นสัดและผสมพันธุ์แล้ว ลดอาหารลงเหลือวันละ 1.5-2 กิโลกรัม

- แม่สุกรไม่เป็นสัดเกิน 15 วัน แสดงว่าแม่สุกรผิดปกติ ให้ลดอาหารลงเหลือวันละ 2 กิโลกรัม และหาวิธีการทำให้แม่สุกรเป็นสัด โดยทำให้แม่สุกรเกิดความเครียด ใช้วิธีต้อนขังรวมกัน (แม่สุกรขนาดน้ำหนักตัวใกล้เคียงกัน) หรือขังสลับคอกทุก ๆ 10 วัน ส่วนใหญ่แม่สุกรก็จะเป็นสัด ถ้าหากปฏิบัติเช่นนี้แล้วภายใน 1 เดือน แม่สุกรยังไม่เป็นสัด ควรคัดแม่สุกรออกไปจากผู้งู

ข้อแนะนำในการเลือกใช้อาหารเลี้ยงสุกร

1. ผสมอาหารใช้เองในฟาร์ม ต้องรู้จักเลือกวัตถุดินอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพดี วัตถุดินตัวหลัก ๆ ได้แก่ กากถั่วเหลือง ปลาป่น ปลายข้าว ข้าวโพด รำละเอียด และไวนามินแร่ธาตุในรูปของพรีเมิกซ์ แล้วนำวัตถุดินมาผสมตามสูตรและความต้องการของสุกรแต่ละขนาด โดยใช้เครื่องผสมอาหาร หรือผสมด้วยมือก็แล้วแต่สะดวก โดยอาศัยหลักผสมจากส่วนย่อยที่มีปริมาณน้อย ๆ ก่อน แล้วจึงผสมเข้ากันส่วนใหญ่ วิธีนี้จะประหยัด สามารถเลือกใช้อาหารราคาถูก และหาได้ง่ายในท้องถิ่น เป็นการลดต้นทุนการผลิตได้มาก ซึ่งในเอกสารนี้ มีสูตรอาหารที่ใช้เลี้ยงสุกรตั้งแต่สุกรนมจนถึงสุกรพ่อแม่พันธุ์

2. ใช้อาหารเม็ดสำเร็จรูป ตั้งแต่สุกรนม สุกรอ่อน สุกรเล็ก สุกรรุ่น สุกรขุน และสุกรพันธุ์ ข้อดีคือสะดวกในการใช้และจัดหา ซึ่งอาหารสำหรับสุกรแต่ละขนาด จะมีจำหน่ายตามห้องค่าคราด ข้อเสียคือราคากะเพง และผู้ใช้ไม่ทราบชัดเจนว่าอาหารเม็ดสำเร็จรูปประกอบด้วยวัตถุดินอะไรบ้าง

3. ใช้หัวอาหารสำเร็จ (ส่วนใหญ่จะมีโปรตีนประมาณ 32-36 เปอร์เซ็นต์ และผสมไวนามินแร่ธาตุไว้ด้วยแล้ว) ใช้ผสมกับปลายข้าว ข้าวโพด รำละเอียด ตามอัตราส่วนน้ำหนักที่ระบุจำนวนวัตถุดินข้างถุงอาหาร การใช้ในสุกรแต่ละขนาดให้คำนึงถึงเปอร์เซ็นต์โปรตีนในอาหารผสมด้วย

โรงเรือนสุกร

โรงเรือนที่ดีจะสะควรในการจัดการฟาร์ม สุกรจะอยู่ภายในคอกอย่าง
สบาย ขั้นตอนในการสร้างโรงเรือนสุกรมีดังนี้

1. **สถานที่ก่อสร้างโรงเรือนสุกร** ควรเป็นที่ดอนน้ำไม่ท่วม มีที่
ระบายน้ำได้ดี ห่างไกลจากที่ชุมชน ตลาด และผู้เดิ่งสุกรรายอื่น

2. **สร้างโรงเรือนสุกรตามแนววันออก-ตะวันตก** และระยะห่าง
ของแต่ละโรงเรือนประมาณ 20-25 เมตร เพื่อแยกโรงเรือนออกจากกัน
เป็นสัดส่วน

3. ลักษณะของหลังคาโรงเรือนสุกรมี 5 แบบด้วยกัน ดูตามรูป

3.1 แบบเพิงหมาแหงน โรงเรือนแบบนี้สร้างง่าย ราคาถูก ก่อสร้างด้วยไม้สัก
แต่มีข้อเสีย คือ แสงแดดจะส่องมากเกินไปในฤดูร้อน ทำให้อุณหภูมิภายใน
โรงเรือนสูง ในฤดูฝนน้ำฝนจะสาดเข้าไปในโรงเรือนได้ง่าย ทำให้ภายใน
โรงเรือนชื้นและ ข้อเสียอีกอย่างหนึ่ง หากมุงหลังคาด้วยหญ้าคา แฟก และจาก
จะต้องให้มีความลาดเอียงของหลังคาดีกว่าชั้นสูง เพื่อให้น้ำฝนไหลลง
จากหลังคาด้วยคอกไปท้ายคอกได้สะดวก มีข้อดีที่ทำให้น้ำฝนรั่วลงในตัวโรงเรือน

3.2 แบบเพิงหมาแหงนกลาย จะเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นกว่าแบบ
เพิงหมาแหงน แต่มีข้อดีสามารถใช้บังแสงแดด ป้องกันฝนสาดได้ดีขึ้น

3.3 แบบหน้าจั่ว ราคาถูกกว่า สร้างจะสูงกว่าสองแบบแรก แต่ดีกว่า
มาก ในเรื่องการป้องกันแสงแดดและฝนสาด โรงเรือนแบบนี้ถ้าสร้างสูงจะดี
เนื่องจากอากาศภายในโรงเรือนจะเย็นสบาย แต่ถ้าสร้างต่ำหรือเดี้ยวกันไป
จะทำให้อากาศภายในโดยเฉพาะตอนบ่ายร้อนอบอ้าว อากาศร้อนจะไม่มีช่อง
ระบายออกด้านบนของหลังคา


3.4 แบบจั่วสองชั้น เป็นแบบที่นิยมสร้างกันทั่วไป มีความปลอดภัย
จากแสงแดดและฝนมาก อากาศภายในโรงเรือนมีการระบายถ่ายเทได้ดี แต่
ราคาค่าก่อสร้างจะสูงกว่าสามแบบแรก แต่ก็นับว่าคุ้มค่า ข้อแนะนำก็คือ ตรงจั่ว
บนสุด ควรให้ปีกหลังคาบนยื่นยาวลงมาพอสมควร ทั้งนี้เพื่อป้องกันฝนสาดเข้า

ในช่องจั่ว ในกรณีที่ฝนตกแรง ทำให้คอกภายในชั้นและ โดยเฉพาะลูกสุกร จะเจ็บป่วย เนื่องจากฝนสาดและทำให้อาการภายในโรงเรือนมีความชื้นสูง

3.5 แบบจั่วสองชั้นกลaley มีคุณสมบัติคล้ายๆ กับแบบจั่วสองชั้น หลังคาโรงเรือนแบบนี้ เพื่อต้องการขยายเนื้อที่ในโรงเรือนให้กว้างใหญ่ขึ้น และ จะดีในเมืองกันฝนสาดเข้าไปในช่องจั่วของโรงเรือน

4. วัสดุที่ใช้มุงหลังคา ขึ้นอยู่กับงบการลงทุน วัสดุที่ใช้ เช่น กระเบื้อง อะลูมิเนียม สังกะสี แฟก และจาก เป็นต้น

5. ความสูงและความกว้างของโรงเรือน ถ้าโรงเรือนสูงและกว้าง จะมีส่วนช่วยให้ภายในโรงเรือนเย็นสบาย ถ้าเลี้ยงสุกรขุนมาดจะสร้างคอกเป็น 2 acco มีทางเดินอยู่ตรงกลาง ขนาดของคอก ด้านหน้ากว้าง 4 เมตร ยาวไป ด้านท้ายคอก 3.5 เมตร (พื้นที่ขุนมาด 8-10 ตัว) หลังคาจั่ว 2 ชั้น ควร สูงประมาณ 8 เมตร ความยาวของโรงเรือนตามความเหมาะสม 20-100 เมตร



รูปแสดงตัวอย่างโรงเรือนแบบต่างๆ

6. พื้นคอก โดยทั่วไปสร้างโรงเรือนเลี้ยงสุกรด้วยพื้นคอนกรีต ซึ่งจะประยัดเงินลงทุน ยกเว้นถ้าจะสร้างโรงเรือนสุกรพ่อแม่พันธุ์ อาจจะเป็นพื้นสองชั้นหรือเรียกว่าพื้นสแล็ต (พื้นสแล็ตสำเร็จรูปเป็นแผ่นมีรูเป็นช่องๆสำหรับให้น้ำไหลจากพื้นชั้นบนลงไปพื้นชั้นล่าง) ใช้งบลงทุนมาก แต่สะดวกในการจัดการดูแลสุกรพ่อแม่พันธุ์ และแม่สุกรเลี้ยงลูก

7. ผนังคอก ทั่วๆไป มักใช้อิฐบล็อก เป็นน้ำ ลวดถัก ไม้ขนาด $1.5 \text{ นิ้ว} \times 3 \text{ นิ้ว}$ ความสูงของผนังคอกจะสูงประมาณ 1 เมตร ถ้าเป็นสุกรพ่อพันธุ์ควรสูง 1.2 เมตร

ชนิดของโรงเรือน

1. โรงเรือนสุกรพันธุ์ มีคอกพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ท้องว่าง แม่พันธุ์อุ้มท้อง และคอกคลอด

- คอกพ่อพันธุ์ขนาด $2 \times 2.2 \text{ เมตร}$ สูง 1.2 เมตร (กว้างxยาวxสูง)
- คอกแม่พันธุ์ท้องว่างขนาด $0.6 \times 2.2 \text{ เมตร}$ สูง 1 เมตร
- คอกแม่พันธุ์อุ้มท้องขนาด $1.2 \times 2.2 \text{ เมตร}$ สูง 1 เมตร
- คอกคลอด ขนาด $2 \times 2.2 \text{ เมตร}$ สูง 1 เมตร (ซองแม่คลอดขนาด $0.6 \times 2.2 \text{ เมตร}$ สูง 1 เมตร ที่เหลือจะเป็นบริเวณสำหรับลูกสุกร)



คอกพ่อพันธุ์สุกร



คอกแม่สุกรท้องว่าง



คอกแม่พันธุ์ท้องว่าง



คอกแม่สุกรอุ้มท้อง



คอกสุกรคลอด



คอกสุกรคลอด

- สำหรับเกยตรรรายย่อยคอกแม่พันธุ์ที่เหมาะสม ควรมีขนาด 1.5×2.0 เมตร สามารถใช้เป็นคอกเลี้ยงขาเดียว และใช้เป็นคอกคลอดได้ด้วย ถ้าใช้เป็นคอกคลอดให้ทำช่องไม้ขันขนาดกว้าง 60 เซนติเมตร ยาว 2.0 เมตร ให้แม่สุกรอยู่ในช่องคลอด ส่วนลูกสุกรปล่อยอยู่ร่อน ๆ ของคลอด (ภายในคอกคลอด)

2. โรงเรือนสุกรเล็กและสุกรรุ่น

- คอกสุกรเล็ก (ลูกสุกรหย่านมหรือน้ำหนักประมาณ 6-20 กิโลกรัม) ขนาด 1.5×2 เมตร สูง 0.8 เมตร
- คอกสุกรรุ่น (สุกรขนาด 20-35 กิโลกรัม) ขนาด 2×3 เมตร สูง 1 เมตร



គោកស្តុបាត



គោកស្តុបាត

3. វង់រៀនសុករបុន

គោកសុករបុននិយមស្នាំរៀនគោកបី 2 និង មីថាគារធំទីនូវឈើតែងតាម
មីនុយ៉ាវាអាហារឈើតាមណានា កើកនាយកធនាគារនឹងតិចឈើតាមលេងគោក កើកនាយកធនាគារ
ពីគោកប្រមាល 50 ម៉ែត្រ ឯការណ៍គោក 4x3.5 ម៉ែត្រ ឯការណ៍គោក
ឈើ 1 ម៉ែត្រ ឱងសុករបុនឯការណ៍ 60-100 កិឡូក្រោម ។ ដី 8-10 តុ សំគាល់
ខ្លួនវង់រៀនកើតិចឈើក្នុងជាន់រៀនសុករបុន ដើម្បីលើយកវាទំនួរការគោក
វង់រៀនទៅក្នុង សុករបុនតាមតាមលេងបនពីគោកប្រមាល ដែលត្រូវបានរៀន
តាមរាយម៉ែត្រ/តុ



វង់រៀនសុករ

ลักษณะระบบของโรงเรือนสุกร

1. โรงเรือนระบบเปิด หมายถึงโรงเรือนที่ควบคุมสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ และอุณหภูมิจะแปรไปตามสภาพของอากาศรอบโรงเรือน

2. โรงเรือนระบบปิด หมายถึงโรงเรือนที่สามารถควบคุมสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับความเป็นอยู่ของสุกร ได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้น การระบายอากาศและแสงสว่าง สามารถป้องกันพาหะนำโรคได้ โรงเรือนปิด เช่น โรงเรือนอีแวร์ป (Evaporative Cooling System) เป็นต้น ราคาลงทุนครั้งแรกค่อนข้างแพง แต่สุกรจะอยู่สุขสบายและโตเร็ว



โรงเรือนระบบ Evaporative Cooling System

การสุขาภิบาล การป้องกันโรค และโรคติดต่อในสุกร

การสุขาภิบาล หมายถึงการจัดการเพื่อให้สัตว์อยู่อย่าง sanitary ปลอดภัยจากเชื้อโรคต่าง ๆ การทำความสะอาด การให้อาหารที่ดี และการจัดการที่จะเป็นประโยชน์ต่อการผลิตสุกร

การทำความสะอาดออกสุกร การทำความสะอาดออกสุกรทุกวัน (โดยการกวาดแห้งด้วยไม้กวาด ตักเอามูลสุกรออก) และล้างออกด้วยน้ำอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง ควรล้างออกด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเดือนละครั้ง นอกจากนี้การทำบ่อเก็บมูลสุกร เพื่อป้องกันกลิ่นและของเสียจากมูลสุกรไปรบกวนเพื่อนบ้าน

วิธีการป้องกันกำจัดกลิน และของเสียจากฟาร์มสุกร

เนื่องจากปัจจุบันมีปัญหามลภาวะกลินมูลสุกรจากฟาร์มสุกร ไปรบกวนชาวบ้านใกล้เคียงให้รำคาญ ตลอดจนการระบายน้ำเสียจากฟาร์มสุกรลงสู่แม่น้ำดังนั้นผู้เลี้ยงสุกรควรจะต้องคำนึงถึงการป้องกันกำจัดกลิน และการเก็บของเสียจากฟาร์มสุกร ซึ่งมีข้อเสนอแนะในการจัดการดังนี้

1. **บ่อในโไอแก๊ส** ฟาร์มเลี้ยงสุกรขนาดใหญ่เลี้ยงสุกรหนึ่งพันตัวขึ้นไป ควรสร้างบ่อในโไอแก๊ส เพื่อเก็บมูลสุกร และนำพลังงานจากบ่อในโไอแก๊ส ซึ่งอยู่ในรูปของแก๊สเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า ไปใช้ประโยชน์ในการทำงานในฟาร์มสุกร หรือนำแก๊สที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาหารและกากถุงสุกร เป็นต้น

2. **บ่อบำบัดน้ำเสีย** การทำฟาร์มสุกรควรมีการจัดทำบ่อบำบัดน้ำเสียโดยเฉพาะฟาร์มสุกรที่เลี้ยงสุกรใกล้กับแม่น้ำ บ่อบำบัดน้ำเสียประกอบไปด้วยบ่อตอกตะกอน บ่อหมักและบ่อผึ้ง น้ำล่างคอกสุกรที่ผ่านการบำบัดแล้ว จะลดความสกปรกลงและลดกลิ่นเหม็นของมูลสุกร



บ่อบำบัดน้ำเสีย

3. น่องกระะ ในฟาร์มสุกรของเกษตรกรรายย่อยที่ไม่สามารถสร้างบ่อในโถแก๊สหรือบ่อน้ำดันน้ำเสีย ควรสร้างบ่อกระะไว้เก็บน้ำมูลสุกร ขนาดของบ่อกระะขึ้นอยู่กับจำนวนสุกรที่เลี้ยง ลักษณะของบ่อกระะก็เหมือนกับส้วมชีมที่ใช้ตามบ้านคน ประกอบด้วย 2 บ่อ บ่อแรกจะเป็นบ่อตัดตะกอน ของแข็งจะตกตะกอนลงที่บ่อแรก ส่วนที่เป็นของเหลวจะไหลต่อออกไปยังบ่อที่สอง และของเหลวจากบ่อที่สองจะซึมลงไปในดินหรือต่อท่อระบายน้ำก่อต่อไปของเหลวที่ระบายน้ำออกไปก็จะได้รับการบำบัดน้ำเสียแล้ว

4. การใช้สารจุลินทรีย์ เช่น สารอี.เอ็ม (Effectives Microorganisms) ราดพื้นตามโรงเรือน ตามกองน้ำมูลสุกร หรือราดตามปอน้ำเสียที่รองรับน้ำมูลสุกร สารอี.เอ็มจะช่วยในการลดกลิ่นในฟาร์มสุกร (สารอี.เอ็มนี้เท่าที่ทราบสามารถติดต่อขอซื้อได้ในราคากูก ที่ศูนย์โยเร ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี) สารอี.เอ็ม มีวิธีการเก็บ และหมักเชื้อ (ต่อเชื้อได้เอง) เพื่อนำไปใช้ได้เป็นระยะเวลานาน

การป้องกันโรค

หมายถึง การป้องกันโรคที่จะเกิดขึ้นกับสุกร ป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีน และการสุขาภิบาลออกให้สะอาด

โรคที่สำคัญในสุกร

1. โรคหัวต์สุกร

เป็นโรคที่ระบาดรุนแรง เกิดจากเชื้อไวรัส พนว่าเป็นได้กับสุกรทุกอายุ เมื่อเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายโดยการกินอาหาร กินน้ำ หายใจหรือโดยทางน้ำดแพลงที่ผิวนัง ใช้เวลาฟักตัว 3 วัน ถึง 3 สัปดาห์ แต่โดยทั่วไปประมาณ 7 วัน อาการที่พบคือ มีไข้สูง 105-108 องศา Fahrneไฮต์ สุกรจะเบื่ออาหารชิม เยื่อตาอักเสบ (มีขี้ตา) ท้องผูก (ที่เป็นเม็ด) และท้องร่วง (ที่เป็นน้ำ)

อาจพบอาการอาเจียนร่วมด้วย ผิวหนังบริเวณทุ คอก ห้อง และด้านในของขาหนีบ จะพบจุดเลือดออกเล็กๆ ทำให้ผิวหนังนั้นมีสีแดง และต่อมอาจเปลี่ยนเป็นสีม่วง ในแม่สุกรท้องอาจจะเกิดการแท้งลูก ติดต่อจากสุกรตัวหนึ่งไปยังตัวอื่นได้รวดเร็วมาก ภายใน 7 วัน อาจเกิดโรคหัวใจได้ทั้งฟาร์มเมื่อสุกรเป็นโรคหัวใจแล้ว อัตราการตายสูงถึง 90 เปอร์เซ็นต์ และไม่มีทางรักษา



การป้องกัน ทำวัคซีนเมื่อลูกสุกรอายุประมาณ 6 สัปดาห์ และสำหรับสุกรพ่อแม่พันธุ์ ควรทำวัคซีนทุก 6 เดือน ห้ามทำวัคซีนกับสุกรที่อ่อนแอหรือสัตว์ป่วย หรือในสุกรตั้งท้องแก่ใกล้คลอด

2. โรคป่ากและเท้าเปื้อย

เป็นโรคติดต่อที่รุนแรง ติดต่อได้อย่างรวดเร็วในสัตว์กีบคู่ (โค, กระนือ, แพะ, แกะ, สุกร) โรคนี้เป็นได้กับสุกรทุกอายุ อัตราการเกิดโรคสูงแต่อัตราการตายต่ำ เกิดจากเชื้อไวรัส ซึ่งในเมืองไทยขณะนี้พบอยู่ 3 ชนิด คือ โอล เอ และเอเชียวน (ชนิดโอลรุนแรงที่สุด) เมื่อเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายสุกรแล้ว จะใช้เวลาในการฟักโรคประมาณ 3-6 วัน สุกรจะเริ่มแสดงอาการป่วยอย่างมาให้เห็น อาการที่พบได้คือ มีตุ่มน้ำใสที่บริเวณปลายจมูก ปาก ลิ้น ริมฝีปาก เหงือก และผิวหนังบริเวณไรเกิน ต่อมมาตรฐานน้ำใสจะแตก นอกจากนี้ยังพบอาการไข้สูง เบื้องอาหาร น้ำลายยืด ชาเจ็บ กีบลอกหลุด และน้ำหนักลด



การป้องกัน ทำวัคซีนลูกสุกรอายุประมาณ 7 สัปดาห์ และให้ทำวัคซีนอีกครั้ง ในอีก 2 สัปดาห์ต่อมา และสำหรับสุกรพ่อแม่พันธุ์ ทำวัคซีนทุก ๆ 4-6 เดือน

นอกจากนี้ก็มีโรคติดต่อในสุกรชนิดอื่นซึ่งมีความสำคัญ ต้องอาศัยวิธีป้องกันโรค เช่น โรคพิษสุนัขบ้าเที่ยม โรคพองจมูกอักเสบ โรค ที.จี.อี. (โรคกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบติดต่อ) โรคไข้หวัดใหญ่ โรคไฟลามทุ่ง เป็นต้น

การใช้ยาป้องกันและรักษาสุกรเจ็บป่วย

ในการป้องกันและรักษาสุกรเจ็บป่วยด้วยยาชนิดต่างๆ เป็นเรื่องละเอียด และจำเป็นต้องปรึกษาสัตวแพทย์ ในเอกสารเล่มนี้จะกล่าวถึงเรื่องยา พอกสังเขปเท่านั้น

1. ยาปฏิชีวนะ เป็นสารที่สกัดจากจุลชีพบางชนิด ซึ่งสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรค หรือทำให้เชื้อโรคนั้นๆ ถูกทำลายได้ ยาปฏิชีวนะใช้ในการป้องกันและรักษาโรค เช่น โรคปอดบวม หลอดลมอักเสบ การอักเสบต่างๆ แพลงมิหนอง โรคทางเดินอาหาร โรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ modulus อักเสบ โลหิตเป็นพิษ เป็นต้น ยาในกลุ่มนี้ เช่น เพนนิซิลิน สเตรปโตมัยซิน เพนสเตรปโตมัยซิน แอมพิซิลิน กาน่ามัยซิน เทตร้าไซคลีน อ็อกซีเทตร้า-ไซคลีน คลอเทตร้าไซคลีน โนโอมัยซิน ลินโคสเปคโนมัยซิน เป็นต้น

2. ยาซัลฟิ เป็นยาที่สังเคราะห์ขึ้นมา เพื่อใช้ป้องกันและรักษาโรค ยาในกลุ่มนี้ เช่น สโตรเมซ ไบร์น่า ไตรซัลฟาน ไตรเวทрин เวชูลอง ชาダメท ซัลฟามเօราเซ็น ซัลฟากวิน็อกชาลีน ซัลฟามเthetaเซ็น ซัลฟ้าไดอาเซ็น ซัลฟานิลาไมด์ ซัลฟ้าไทาโซน เป็นต้น

3. ยาบำรุง ส่วนใหญ่เป็นยาเข้าในรูปฟองฟอร์ส แคเลเซียม แมกนีเซียม น้ำตาลกลูโคส ตลอดจนวิตามิน และแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับร่างกาย ช่วยกระตุ้นให้การดูดซึมของระบบการย่อยอาหารให้ดีขึ้น ยาในกลุ่มนี้ เช่น โภโนฟอสฟาน อาริซิล คาโตชาล ไวตาเล็กซ์ อมิโนໄล์ คัลมาเด็ก (แคเลเซียมโนโรกลูโคเนท) ไวตามินเอชนิดฉีด วิตามินบี-คอมเพล็กซ์ มัลติวิตามิน เป็นต้น

4. ยา慢่าเชื้อโรค ใช้ล้างคอกโดยทั่วไป เช่น ไอชาล ชานิตัส เชฟล่อน ไอโอดีน ฟอร์มาลีน จุนสี น้ำยาไลโซน โซดาไฟ คลอริน ปูนขาว วันคลีน แบบทเกลส์ ไบโอดีน ไบโอดีซิค ไบโอดีลีน ฟาร์มฟลูอิดເອສ เป็นต้น ซึ่งมีวิธีการและข้อจำกัดในการใช้แตกต่างกัน ควรศึกษาให้เข้าใจ ก่อนใช้งาน

5. ยา慢่าพยาธิภายนอก ใช้ม้าพวากเห็บ เหา ไร จี้เรือน จี้เรือนแห้ง ในสุกร เช่น เอ็นโก้ เย็นโก้ ไฟสเปรย์ มาลาเฟช มาลาไฮอ่อน เชฟวินส์ เยอร์เม็ก อาชุนโทน เนกุวน ยาฉีดไอโวเม็ก โพเรค เป็นต้น

6. ยาถ่ายพยาธิ ยา慢่าพยาธิในลำไส้ของสัตว์ที่ใช้กันมากที่สุด คือ ตัวยาปีเพอร์ราเซ็น คาร์บอนเตตราชลอไรด์ ไฟแแรนเทลการ์เทรด ไทอะเบนดาโซล เป็นต้น ซึ่งการค้าได้แก่ เวอร์บาน ดาวซีน ออกโทชาน วอร์ม-เอ็กซ์ แบนมินซ์ ไอโวเม็ก (สำหรับฉีด) เลมิโซล 10% เลวาไซด์ ลีวะลิน 10% เป็นต้น

7. ยาที่ใช้กรอกปากลูกสุกร เพื่อป้องกันและรักษาลูกสุกรท้องเสีย เช่น ฟาร์โนเซนปายลิน (ปั๊มปากลูกสุกร ตัวยาคลอเทตราชลอไรด์) โคลา-การ์ด (ปั๊มปากลูกสุกร ตัวยาสเตรปโตมัยซินซัลเฟต ซัลฟ้าไฮอาโซน อะไโตรฟีนซัลเฟต) ไ/do/ะตรีมชนิดน้ำ (ปั๊มปากลูกสุกร ตัวยาไ/dr/เมโซพริม ซัลฟ้า/do/อาชีน) โนโรดีนชนิดน้ำ (ปั๊มปากลูกสุกร ตัวยาซัลฟ้า/do/อาชีน ไ/dr/เมโซพริม) เป็นต้น นอกจากนี้อาจจะใช้ยาผงละลายน้ำให้ลูกสุกรกิน หรือ กรอกปากลูกสุกรก็ได้ เช่น นีโอนิกซ์ 325 เคดี-นีโอล เป็นต้น

8. ยาใส่แพล ใช้ใส่แพลสดและแพลเรือรัง เช่น ทิงเจอร์ไอโอดีน ยาเหลือง เจนเชียนไวโอลเคลต (ยาสีม่วง) ซัลฟานิลามีด เนกاشันท์ ลูกเหม็น (ใช้慢่าหนองในแพลเรือรัง) สครูอ์ม จี้ผึ้งซัลฟานิลามีด จี้ผึ้งกำมะถัน แอลกอฮอล์ เป็นต้น

9. ฮอร์โมน ฮอร์โมนที่ใช้ในการกระตุ้นลมเบ่งในแม่สุกร เช่น ฮอร์โมน อ็อกซิโตซิน ส่วนฮอร์โมนพรอสตาแกลนдин เอฟ 2 อัลฟ่า (Prostaglandin F_{2α} ชื่อการค้า ลูทาไอล์ส) เป็นฮอร์โมนที่ใช้ฉีดในแม่สุกร เพื่อใช้กำหนดช่วงระยะเวลาคลอดให้แม่สุกร ทำให้สะดวกในการจัดการ หรือใช้ในการณ์ที่แม่สุกร ครบกำหนดคลอดแล้ว (114 วัน) แต่ไม่คลอดหลังจากฉีดแล้วจะช่วยให้ แม่สุกรคลอดลูกภายใน 36 ชั่วโมง ในการใช้ฮอร์โมนให้ศึกษาวิธีการใช้ให้ ละเอียด และควรปรึกษาสัตวแพทย์ เพราะอาจส่งผลเสียต่อสัตว์และผู้ใช้ได้

10. ชาตุเหล็ก เพื่อป้องกันโรคโลหิตจางในลูกสุกร เช่น ไฟเด็กซ์ ไมโอเฟอร์ พิกซ์เดร็ก ไออรอน-เดร็กทราน โรนาเด็ก เป็นต้น

การฉีดยาและการจับสุกรตัวโตฉีดยา

การฉีดยาในเอกสารเล่มนี้ จะกล่าวถึงเนื้นเฉพาะการฉีดยาเข้า กล้ามเนื้อ และฉีดยาเข้าใต้ผิวนังเท่านั้น การฉีดยาหรือฉีดวัคซีนในสุกร ตัวเล็กคงจะไม่มีปัญหา เพราะสามารถจับสุกรได้ง่าย ส่วนสุกรตัวโตคงจะต้องมี วิธีการจับสุกรให้ยืนนิ่ง เพื่อสะดวกในการฉีดยา

1. การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ (Intramuscular injection)



ตำแหน่งที่ฉีดยา สุกรตัวโตฉีด ตรงกล้ามเนื้อบริเวณคอ ห่างจากโคนหู ประมาณ 2 นิ้ว ใช้เข็มเบอร์ 18 ยาว 1.5 นิ้ว โดยแทงเข้มในลักษณะตั้งฉากกับ จุดที่แทงเข้ม สุกรตัวเล็กควรฉีดที่บริเวณ กล้ามเนื้อขาหลังด้านในโดยใช้เข็มขนาด และความยาวลดลงตามขนาดสุกร

2. การฉีดยาเข้าใต้ผิวหนัง (Subcutaneous injection)



ตำแหน่งที่ฉีด นิยมฉีดใต้ผิวหนัง ห่างจากโคนหูประมาณ 2-3 นิ้ว โดยดึงหนังขึ้นແ teng เจ้มให้ผ่านชั้นผิวหนังเข้าไปในระหว่างชั้นผิวหนังกับชั้นกล้ามเนื้อ โดยແ teng เจ้มเฉียง ๆ ต้องใช้เจ้มที่แหลมคม ตำแหน่งที่ฉีดอื่น ๆ เช่น บริเวณกึ่งกลางของขาหน้า โดยແ teng เจ้มนานกับลำด้า หรือฉีดตรงบริเวณซอกรักแร้ขาหน้า ก็ได้เข้มความมีความคอมมาก

3. การจับสุกรตัวโดยฉีดยา

ใช้เชือกหรือลวดผูกปาก โดยทำเป็นบ่วงรัดเหนือเขี้ยวในปากสุกร รัดเชือกให้แน่น นำปลายเชือกอีกด้านหนึ่งไปผูกไว้กับเสา ปกติธรรมชาติของสุกรเมื่อโดนเชือกผูกปากสุกรจะถอยหลังเดิมที่ ทำให้สามารถจับสุกรฉีดยาได้ง่าย

การเคลื่อนย้ายสุกร

เพื่อป้องกันสุกรตายในระหว่างขนย้ายให้ควรปฏิบัติดังนี้

1. การเตรียมรถยก บุพเพรยนต์ด้วยฟางหรือหญ้าแห้ง หรือต้นกล้วยหรือดินราย เพื่อป้องกันสุกรลื่น ถ้าเป็นสุกรพ่อพันธุ์ควรจัดเตรียมกรง ถ้าขนย้ายสุกรจำนวนมากให้จัดเตรียมแพงกันเป็นล็อก เพื่อป้องกันสุกรไหหลบพับกันตาย และต้องมีแพงกันห้ายรถยกด้วย รถยกต้องมีหลังคาป้าใบหรือตาข่ายรองแสง เพื่อป้องกันแดดและฝน

2. การจัดการสุกรเมื่อขึ้นรถยกแล้ว ในระหว่างการเคลื่อนย้ายระวังอย่าให้สุกรร้อน ควรฉีดน้ำให้สุกรเมื่อขึ้นรถยกต์ให้ชุ่มทั้งตัว หรือใช้

น้ำแข็งก้อนใหญ่ (เป็นเมือ) ทุบ วางบนพางพื้นรถยนต์เพื่อช่วยทำให้เย็นขึ้น และให้สูกรเลียเพื่อลดความเครียด ขณะเดินทางไม่ควรหยุดพักรถยนต์โดยไม่จำเป็น ถ้าสังเกตดูว่าสูกรมีอาการบ่งบอกว่าร้อน เช่น หายใจหนัก ให้เวลัดน้ำให้แก่สูกร โดยราดน้ำที่บริเวณหัวสูกรก่อน จากนั้นจึงราดบริเวณลำตัว และควรเลือกเดินทางในขณะที่อากาศเย็นสบาย ไม่ร้อนมากนัก เช่น ตอนบ่ายใกล้ค่ำ หรือตอนกลางคืน เป็นต้น

3. การจัดการเมื่อสูกรถึงปลายทาง เมื่อถึงฟาร์มปลายทางหลังจากนำสูกรลงจากรถแล้ว ควรให้สูกรพักผ่อนสักระยะหนึ่ง ไม่ควรรีบร้อนให้น้ำและอาหารทันที จากนั้นให้หนาน้ำสะอาดดื่นให้กิน ควรละลายเกลือแร่ (อีเลคโทรไลท์) หรือวิตามินกับน้ำสะอาดดื่นให้สูกรกินในช่วง 3-5 วันแรก และให้ทำการกักโรคสูกรโดยแยกสูกรเลี้ยงต่างหาก เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน (ในกรณีที่สามารถปฏิบัติได้)



ผู้เลี้ยงสุกรจะได้ผลกำไรอย่างไร

ผลกำไรของผู้เลี้ยงสุกรจะได้จากสุกรขันที่โตเร็ว ใช้อาหารน้อย เนื้อแดงมาก (ไขมันบาง) และจากแม่ที่ให้ลูกดกเลี้ยงลูกเก่ง ข้อดีทั้ง 4 ข้อ ที่กล่าวมา นี้ไม่สามารถมีได้ในสุกรพันธุ์เดียว ดังนั้นจะต้องแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มสายพ่อพันธุ์และกลุ่มสายแม่พันธุ์

1. กลุ่มสายพ่อพันธุ์ การใช้พ่อสุดท้ายในการผลิตสุกรขัน เพื่อให้สุกร ขันมีเนื้อแดงมาก โดยไม่ต้องใช้สารเร่งเนื้อแดง ดังนั้นการปรับปรุงพันธุ์สุกร เพื่อให้สุกรขันโตเร็ว ชาวดี จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยทั่วไปฟาร์มสุกร นิยมให้สุกรพันธุ์ดูรอด เป็นพ่อสุดท้ายในการผลิตสุกรขัน อย่างไรก็ตาม เพื่อ เป็นทางเลือกของเกษตรกร กรมปศุสัตว์จึงได้ปรับปรุงพันธุ์สุกรอีกหลายสายพันธุ์ เพื่อใช้เป็นพ่อ สุดท้ายในการผลิตสุกรขัน (พ่อสุดท้ายหมายความว่าใช้เป็นพ่อ พันธุ์ในการผลิตสุกรขันส่งตลาดอย่างเดียว โดยไม่ต้องนำลูกหรือสุกรขันเหล่า นั้นมาใช้ทำพันธุ์ต่อ)

2. กลุ่มสายแม่พันธุ์ ปัจจุบันนิยมใช้แม่ลูกผสมสองสาย ลาร์จไวท์ x แลนด์เรช หรือ แลนด์เรช x ลาร์จไวท์ ซึ่งเป็นที่ยอมรับของผู้เลี้ยงสุกรว่าให้ ลูกดก มีลูกหย่านมต่อครองสูง ลักษณะการให้ผลผลิตของสุกรสองสายพันธุ์ ตั้งก烙่า จะเป็นลักษณะที่แสดงออกชัดเจนคือพ่อแม่ (Heterosis สูง) อย่างไร ก็ตาม ต้นพันธุ์คือ พันธุ์แท้แลนด์เรช และพันธุ์แท้ลาร์จไวท์ จะต้องได้รับการ ปรับปรุงพัฒนาลักษณะการเจริญเติบโต ความหนาไขมัน ควบคู่กับลักษณะการ ให้ผลผลิตดี พ่อแม่พันธุ์แท้ทั้งสองพันธุ์จะต้องมีลักษณะที่ดีมีความนิ่งของ สายพันธุ์ จึงจะมีโอกาสเกิด Heterosis (ดีเด่นกว่าพ่อแม่) ในระดับสูง

ตารางที่ 1 สูตรอาหารสำหรับสุกรพ่อแม่พันธุ์ ลูกสุกรหย่านม สุกรพันธุ์ และสุกรบุน

รายการ	หมูนิม 0-6 กก.	สุกรหย่านม 4-9 สัปดาห์ 6-25 กก.	สุกรรุ่น 9 สัปดาห์ ขึ้นไป 25-90 กก.	สุกร ภาคตะวันพันธุ์ 25-90 กก.	สุกร แม่ชื่นท้อง	แม่สุกร เลี้ยงลูก	เมอร์เซ็นต์ โปรดีนใน อาหาร	พลังงานใช้ ประโยชน์ได้ (กิโลแคลอรี่/ กก.)	ราคาวัสดุคิด ต่อ กิโลกรัม (บาท)
ข้าวโพด	-	-	-	-	-	-	8	3168	5.0
ปลาแซ่บนำไปต้ม	45.0	49.8	-	-	-	-	8	3596	5.4
ปลาช่อน	-	-	58.0	51.7	50.0	56.0	8	3596	5.8
รำละเลียง	-	-	20.0	15.0	30.0	20.0	12	3120	4.3
หางนมผง	10.0	5.0	-	-	-	-	26	3570	38.0
เศษเส้นหมี่	-	-	-	-	-	-	4	-	5.0
กาอ้วนเหลืองสักดันน้ำมัน	-	16.0	15.0	21.0	13.0	16.0	44	2825	11.2
ข้าวเคลืออบไข่มันสูง	32.0	16.0	-	-	-	-	38	3704	11.6
ปลาป่น	7.0	5.0	4.0	5.0	4.0	4.0	56	2550	25.0
ไಡแคลร์เชี่ยวนาอิสเท็ก	2.0	3.0	2.0	4.0	2.0	3.0	-	-	14.5
น้ำตาลทราย	3.0	2.0	-	-	-	-	-	3680	15.0
ไขมัน	-	2.0	-	2.0	-	-	-	8300	20.0
เกลือป่น	-	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	-	-	4.0
กาเก็นดาล	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ไลซีน	-	-	-	-	-	-	-	-	100
ยาปูรูวานะ	0.5	0.4	0.25	0.3	0.15	0.25	-	-	200
พริกกี้ซ์	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	-	-	74
รวม	100	100	100.25	100	100.15	100.25	-	-	-
เมอร์เซ็นต์โปรตีน	22.28	21.20	15.16	17.98	15.56	16.16	-	-	-
พลังงาน (กิโลแคลอรี่/กก.)	3445	3381	3235	3214	3203	3192	-	-	-
ราคากิโลกรัม	14.08	12.00	8.24	9.42	7.80	8.40	-	-	-

- หมายเหตุ - ข้าวโพดและปลาช่อนนำไปใช้ทดแทนกันได้
 - ราคาวัสดุคิด และราคาอาหารต่อ 1 กิโลกรัม พันแปร์เซ็นต์ลงตามราคากิโลกรัม ณ เดือนมีนาคม 2544

ตารางที่ 2 แสดงส่วนประกอบของสารอาหารในวัตถุดิบอาหารสัตว์ชนิดต่าง ๆ

วัตถุดิบ	ความชื้น	โปรตีน	ไขมัน	เออร์ไอย	เต้า	พลังงานใช้ประโยชน์ได้ (กิโลแคลอรี่/กг.) (สูตร)	แคลเซียม	ฟอสฟอรัส
กาลั่วเหลืองสักน้ำมัน								
ตัวหารเคลื่	10	44.0	1.0	7.0	6.0	2825	0.25	0.20
กาลิสสักน้ำมัน	10	40.0	1.5	9.0	5.5	3260	0.15	0.20
กาโนลีดไขงพารา								
(ผู้กระเทาะเปลือก, อัดน้ำมัน)	8	16.0	6.33	41.52	4.01	1800	0.22	0.09
ปลาป่น	8	55.0	8.0	1.0	26.0	2550	7.7	3.8
กาโนลีดทุน	10	20.4	6.1	19.9	7.1	-	0.38	0.42
กาโนะพร้าว	10	21.0	6.0	12.0	7.0	3080	0.20	0.20
ใบกระเจินป่น	10	20.2	3.5	18.0	8.8	1300	0.54	0.30
ข้าวเปลือก	10	6.0	1.2	9.0	4.5	2360	0.05	0.10
ปลายข้าว	12	8.0	0.9	1.0	0.7	3596	0.03	0.04
รำล่าเรี้ยด	12	12.0	12.0	11.0	10.9	3120	0.06	0.47
รำสักดันน้ำมัน	9	13.9	1.0	13.0	15.0	2200	0.08	0.50
รำหายาบ	9	6.2	4.5	28.4	18.2	-	0.14	0.10
ข้าวโพด	13	8.0	4.0	2.5	1.3	3168	0.01	0.10
ข้าวฟ่าง	13	11.8	3.0	2.5	1.5	3140	0.04	0.10
มันเส้น	10	2.5	0.75	3.7	3.7	3260	0.12	0.05
กาโน๊ดาลา	27	4.0	-	-	7.0	2343	0.80	0.03
ขนไก่ป่น	10	83.5	2.5	1.5	2.5	2760	0.20	0.75
หางนมผง	5	35.0	1.0	-	8.0	3570	1.30	1.0

ตารางที่ 3 แสดงน้ำหนัก อัตราการเจริญเติบโต ปริมาณอาหารของสุกรุ่น

อายุของสุกร (วัน)	น้ำหนัก สุกร (กิโลกรัม)	อัตราการ เจริญเติบโต (กรัม/วัน)	ประสิทธิภาพ การใช้อาหาร	อาหารที่กิน/ ตัว/วัน (กิโลกรัม)	ปริมาณ อาหารที่กินสะสม (กิโลกรัม)
30	6.5	150	-	0.30	0.4
42	9.0	330	1.5	0.50	5.0
60	15.0	500	1.6	1.0	15.0
70	22.0	600	1.8	1.4	27.0
82	30.0	650	2.2	1.5	45.0
94	40.0	700	2.3	2.0	67.0
106	50.0	720	2.3	2.2	90.0
120	60.0	750	2.4	2.4	125
133	70.0	780	2.5	2.6	155
145	80.0	800	2.6	2.8	190
158	90.0	800	3.0	3.0	225
170	100.0	800	3.0	3.0	260

หมายเหตุ - ลูกสุกรน้ำหนัก 0-15 กิโลกรัม จะใช้อาหารปริมาณ 15 กิโลกรัม
 - สุกรุ่นเริ่มจากน้ำหนัก 15 หรือ 20 กิโลกรัม - 100 กิโลกรัม

ตารางหน่วยนคอลด์แมสก์

ผู้สมรู้ร่วมที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
คอลอว์นที่ เบบบบบ	25-ม.ย.	26-ม.ย.	27-ม.ย.	28-ม.ย.	29-ม.ย.	30-ม.ย.	1-พ.ค.	2-พ.ค.	3-พ.ค.	4-พ.ค.	5-พ.ค.	6-พ.ค.	7-พ.ค.	8-พ.ค.	9-พ.ค.	10-พ.ค.
ผู้สมรู้ร่วมที่ เบบบบบบ	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
คอลอว์นที่ เบบบบบบบ	11-พ.ค.	12-พ.ค.	13-พ.ค.	14-พ.ค.	15-พ.ค.	16-พ.ค.	17-พ.ค.	18-พ.ค.	19-พ.ค.	20-พ.ค.	21-พ.ค.	22-พ.ค.	23-พ.ค.	24-พ.ค.	25-พ.ค.	
ผู้สมรู้ร่วมที่ เบบบบบบบบ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
คอลอว์นที่ เบบบบบบบบบ	26-พ.ค.	27-พ.ค.	28-พ.ค.	29-พ.ค.	30-พ.ค.	31-พ.ค.	1-มิ.ย.	2-มิ.ย.	3-มิ.ย.	4-มิ.ย.	5-มิ.ย.	6-มิ.ย.	7-มิ.ย.	8-มิ.ย.	9-มิ.ย.	10-มิ.ย.
ผู้สมรู้ร่วมที่ เบบบบบบบบบ	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
คอลอว์นที่ เบบบบบบบบบบ	11-มิ.ย.	12-มิ.ย.	13-มิ.ย.	14-มิ.ย.	15-มิ.ย.	16-มิ.ย.	17-มิ.ย.	18-มิ.ย.	19-มิ.ย.	20-มิ.ย.	21-มิ.ย.	22-มิ.ย.				
ผู้สมรู้ร่วมที่ เบบบบบบบบบบ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
คอลอว์นที่ เบบบบบบบบบบบ	23-มิ.ย.	24-มิ.ย.	25-มิ.ย.	26-มิ.ย.	27-มิ.ย.	28-มิ.ย.	29-มิ.ย.	30-มิ.ย.	1-ก.ค.	2-ก.ค.	3-ก.ค.	4-ก.ค.	5-ก.ค.	6-ก.ค.	7-ก.ค.	8-ก.ค.
ผู้สมรู้ร่วมที่ เบบบบบบบบบบบ	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
คอลอว์นที่ เบบบบบบบบบบบบ	9-ก.ค.	10-ก.ค.	11-ก.ค.	12-ก.ค.	13-ก.ค.	14-ก.ค.	15-ก.ค.	16-ก.ค.	17-ก.ค.	18-ก.ค.	19-ก.ค.	20-ก.ค.	21-ก.ค.	22-ก.ค.	23-ก.ค.	
ผู้สมรู้ร่วมที่ เบบบบบบบบบบบบ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
คอลอว์นที่ เบบบบบบบบบบบบบ	24-ก.ค.	25-ก.ค.	26-ก.ค.	27-ก.ค.	28-ก.ค.	29-ก.ค.	30-ก.ค.	31-ก.ค.	1-ส.ค.	2-ส.ค.	3-ส.ค.	4-ส.ค.	5-ส.ค.	6-ส.ค.	7-ส.ค.	8-ส.ค.
ผู้สมรู้ร่วมที่ เบบบบบบบบบบบบบ	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
คอลอว์นที่ เบบบบบบบบบบบบบ	9-ส.ค.	10-ส.ค.	11-ส.ค.	12-ส.ค.	13-ส.ค.	14-ส.ค.	15-ส.ค.	16-ส.ค.	17-ส.ค.	18-ส.ค.	19-ส.ค.	20-ส.ค.	21-ส.ค.	22-ส.ค.		
ผู้สมรู้ร่วมที่ เบบบบบบบบบบบบบ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
คอลอว์นที่ เบบบบบบบบบบบบบบ	23-ส.ค.	24-ส.ค.	25-ส.ค.	26-ส.ค.	27-ส.ค.	28-ส.ค.	29-ส.ค.	30-ส.ค.	1-ก.ย.	2-ก.ย.	3-ก.ย.	4-ก.ย.	5-ก.ย.	6-ก.ย.	7-ก.ย.	
ผู้สมรู้ร่วมที่ เบบบบบบบบบบบบบบ	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
คอลอว์นที่ เบบบบบบบบบบบบบบ	8-ก.ย.	9-ก.ย.	10-ก.ย.	11-ก.ย.	12-ก.ย.	13-ก.ย.	14-ก.ย.	15-ก.ย.	16-ก.ย.	17-ก.ย.	18-ก.ย.	19-ก.ย.	20-ก.ย.	21-ก.ย.	22-ก.ย.	
ผู้สมรู้ร่วมที่ เบบบบบบบบบบบบบบ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
คอลอว์นที่ เบบบบบบบบบบบบบบ	23-ก.ย.	24-ก.ย.	25-ก.ย.	26-ก.ย.	27-ก.ย.	28-ก.ย.	29-ก.ย.	30-ก.ย.	1-ต.ค.	2-ต.ค.	3-ต.ค.	4-ต.ค.	5-ต.ค.	6-ต.ค.	7-ต.ค.	
ผู้สมรู้ร่วมที่ เบบบบบบบบบบบบบบ	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
คอลอว์นที่ เบบบบบบบบบบบบบบ	9-ต.ค.	10-ต.ค.	11-ต.ค.	12-ต.ค.	13-ต.ค.	14-ต.ค.	15-ต.ค.	16-ต.ค.	17-ต.ค.	18-ต.ค.	19-ต.ค.	20-ต.ค.	21-ต.ค.	22-ต.ค.		

แบบฟอร์มการผสานพันธุ์

ທະເບີຍນແມ່ສຸກຮຄລອດແລະຫຍໍານມ

แม่นเบอร์.....สายพันธุ์.....พ่อนเบอร์.....สายพันธุ์.....กรอกที่.....ลงทะเบียนกรอก.....

กำหนดคลอด...../...../..... วันคลอด...../...../..... เวลา.....

จำนวนลูกเมื่อคลอด.....ตัว, ตายก่อนคลอด.....ตัว, ตายเมื่อคลอด.....ตัว

จำนวนคุกมิชชิวต.....ตัว (ผู้.....ตัว, เมีย.....ตัว) กำหนดที่ยานมเมื่อ...../...../.....

การปฏิบัติทางสัตวแพทย์

1. การใช้ยาป้องกันโรคโลหิตจางเมื่อ...../...../.....
 2. ฉีดวัคซีนหัวใจสูตรเมื่อ...../...../.....
 3.

แบบสอบถาม

หนังสือคำแนะนำ เรื่อง การเลี้ยงสุกร

1. ชื่อ (นาย/นาง/น.ส./อื่น ๆ) นามสกุล อายุ ปี
2. บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัด.....
3. เพศ 1. ชาย 2. หญิง
4. วุฒิการศึกษาสูงสุด
 1. มัธยมศึกษา 2. อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
 3. บริณญาติหรือเทียบเท่า 4. อื่น ๆ (โปรดระบุ).....
5. อชีพหลัก
 1. เกษตรกร (เลือก) พืช, ประมง, ปศุสัตว์ 2. พนักงานเอกสาร/ธุรกิจส่วนตัว
 3. รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 4. อื่น ๆ (โปรดระบุ).....
6. ท่านได้รับหนังสือเล่มนี้มาจากการใด
 1. กรมปศุสัตว์ (ระบุหน่วยงาน).....
 2. การจัดงานด้านปศุสัตว์ (ระบุชื่องาน).....
 3. อื่น ๆ (โปรดระบุ).....
7. หนังสือเล่มนี้ได้ให้ประโยชน์อะไรกับท่านบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 1. ให้ความรู้ 2. สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป 3. อื่น ๆ (โปรดระบุ).....
8. เหตุผลที่ทำให้ท่านหยิบหนังสือเล่มนี้มาอ่าน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 1. ชื่อเรื่อง/เนื้อหา 2. การจัดรูปเล่มน่าสนใจ
 3. ขนาดตัวอักษรน่าอ่าน 4. อื่น ๆ (โปรดระบุ).....
9. ท่านต้องการทราบอะไรเพิ่มเติมจากหนังสือเล่มนี้อีก (โปรดระบุ)
9.1
9.2
9.3
10. คำถามที่ท่านต้องการถามเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้ อะไรบ้าง (โปรดระบุ)
10.1
10.2
10.3
11. ปัญหาและข้อเสนอแนะอื่น ๆ (โปรดระบุ)
.....

★ ขอบอกพระคุณในความร่วมมือ ★

กรุณาส่งแบบสอบถามนี้ได้ที่

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาการปศุสัตว์และอ่ายกอสเกโนໂຄชี กรมปศุสัตว์
ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2653-4934 E-mail: ausaneec@dld.go.th

เอกสารอ้างอิง

- ประสม บุรณามานัส. 2523. **สุกรและการรักษาโรค.** สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช
จำกัด กรุงเทพมหานคร. 193 หน้า.
- วินัย ประลมพ์กาญจน์. 2527. **การผลิตสุกร.** กรุงสยามการพิมพ์ กรุงเทพมหานคร.
335 หน้า.
- ศรีสุวรรณ ชมชัย. **การเลี้ยงสุกร.** เอกสารเผยแพร่ของศูนย์วิจัยและฝึกอบรม
การเลี้ยงสุกรแห่งชาติ. 29 หน้า.
- สัมฤทธิ์ แสนบัว. **พันธุ์สุกรและการปฏิบัติเลี้ยงดูสุกร.** เอกสารเผยแพร่ของ
กลุ่มงานสัตว์เล็ก กองบำรุงพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์. 41 หน้า.
- สุชิพ รัตรสาร. 2520. **คู่มือปฏิบัติการเลี้ยงสุกร.** เทพพิทักษ์การพิมพ์
กรุงเทพมหานคร. 264 หน้า.
- อุทัย คันໂฉ. 2529. **อาหารและการผลิตอาหารเลี้ยงสุกรและสัตว์ปีก.** เอกสาร
เผยแพร่ของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ. 297 หน้า.

ເລື່ອງສັຕວໃຫ້ໄດ້ພລດີ ຈະຕ້ອນມີ

- ສັຕວພັນຮຸດ
- ອາຫາຣີ
- ໂຮງເຮືອບດີ
- **ການຈັດກາ (ການເລື່ອງຈູດ) ຫີ**
- ການຄວບຄຸມປ້ອງກັນໂຮຄດີ



ມີປັກຫາໃນການເລື່ອງສັຕວ ປຣຶກເຊາໄດ້ກໍ

- ສໍານັກງານປຽກສັຕວຈັງໜວດ
- ສໍານັກພັນທາການປຽກສັຕວແລະດໍາຍກອດເກົກໂນໂລຢີ
- ກອນບໍາຮຸງພັນຮຸດສັຕວ
- ກອນອາຫາຣີສັຕວ
- ຄູນຍົວຈັຍແລະດໍາຍກອດເກົກໂນໂລຢີ